

<b>Nombre:</b> Acido Acetilsalicílico (II) <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Para aliviar dolores e inflamaciones suaves a moderadas, para bajar la fiebre, para aliviar inflamaciones, dolores articulares, y rigidez asociada a artritis.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

Para adultos: 325 – 650mg cada 4 horas.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo en conjunto con alimentos o con un vaso lleno de agua, para evitar la irritación estomacal.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los problemas estomacales pueden ser severos en ancianos.

#### - Consumo de alcohol

Si usted toma alcohol durante el tratamiento con este medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y **hemorragias**.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

No se debe dar este medicamento a niños menores de 12 años, sin consultar la dosis a su médico pediatra.

#### - Precauciones especiales

Este tipo de medicamentos interfiere en la **coagulación** de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos cinco días antes de someterse algún tipo de cirugía, a menos que su médico indique lo contrario.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a este medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente algún medicamento para la presión, gota como **analgésicos**, artritis, anticoagulantes como warfarina, medicamentos para la diabetes como glibenclamida, prednisona.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, desordenes sanguíneos, **insuficiencia cardiaca congestiva**, **diabetes**, gota, **hemofilia**, alta presión sanguínea, enfermedades a los riñones, hígado, tiroides o **ulcera péptica**.

##### - Alimentos

Al tomar en conjunto con alimento o bebidas que contengan cafeína, se puede ver aumentado el efecto de aliviar el dolor.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: vómitos, agitación, fatiga extrema, confusión; reacción alérgica con dificultad para respirar, pérdida del color en la cara, escalofríos, hinchazón de la cara, ojos o párpados.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: : mal estar estomacal, enrojecimiento, náuseas , tinnitus en los oídos, **insomnio**.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, desorientación, vómitos, fiebre, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.