

<b>Nombre:</b> Ácido Dehidrocólico <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> colerético <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para ayudar en la excreción de sales biliares para mejorar la digestión en ciertas enfermedades que lo requieren.

#### 2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Dosis adultos: 250mg cada 8 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento después de las comidas.

- Uso prolongado

Si luego de un par de días sus síntomas persisten debe consultar con su médico, ya que el medicamento puede estar ocultando una enfermedad severa.

#### 3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Este medicamento puede provocar efectos adversos más severos en ancianos, como debilidad, falta de coordinación o hipotensión.

- Embarazo

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

En niños menores de 6 años debe estar indicado por su pediatra.

- Precauciones especiales

Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Debe consultar con su médico si ha presentado alergia a alimentos, preservantes y / o colorantes.

Si usted presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.

#### 5.- Interacciones

#### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente warfarina, acenocumarol, digoxina, ciprofloxacino, etidronato, tetraciclina

#### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de hemorragia rectal de origen desconocido, **colostomia**, bloqueo intestinal, **ileostomia**, diabetes mellitus.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: confusión, calambres musculares, ritmo irregular del corazón, **rash**, mareos.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: calambres, diarrea, náuseas leves.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, **arritmias**, calambres musculares, **rash**, debilidad. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.