

<b>Nombre:</b> Ácido Salicílico <b>Condición de venta:</b> sin receta médica de uso tópico hasta un 5% <b>Clasificación:</b> antiacnéico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Ácido salicílico está indicado en el tratamiento tópico del acné vulgaris.

### 2.- Administración (tópica)

#### - Rango y frecuencia

La dosificación de este medicamento depende de la concentración de ácido salicílico que contenga, de la forma farmacéutica y de la indicación del medicamento; por lo que debe seguir las instrucciones del envase o de su médico si este se lo recetó.

Para el tratamiento del acné habitualmente se utilizan concentraciones desde 0,5% a 5% y se aplica de 1 a 3 veces al día.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Antes y después de aplicarse el medicamento debe lavar sus manos. Debe aplicar el medicamento cubriendo toda el área afectada.

#### - Uso prolongado

El uso prolongado de este medicamento puede causar irritación de la piel, por lo que si luego de una semana los síntomas persisten debe consultar con su médico.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

La piel de los ancianos es más sensible a este tipo de medicamentos, por lo que debe consultar con su médico antes de utilizarlo.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

#### - Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando. No se han observado problemas en el lactante con el uso de este medicamento.

#### - Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, ya que la piel de los niños es más susceptible a presentar irritación con el uso de este medicamento.

- **Precauciones especiales**

No debe aplicar este medicamento en áreas muy extensas de piel, ni utilizarlo por periodos largos de tiempo sin consultar con su médico.

No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca o dentro de la nariz. Si esto ocurre accidentalmente debe lavar con agua corriente por 15 minutos.

Debe consultar al médico si usted ha presentado alergias a otras sustancias como **preservantes** o colorantes.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a ácido salicílico.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar con farmacéutico o su médico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alguna enfermedad que afecte sus vasos sanguíneos, si padece de diabetes mellitus, presenta inflamación, irritación o alguna infección sobre la zona de piel donde va a aplicar el medicamento.

**6.- Efectos adversos**

**Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son:** irritación moderada a severa, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

**Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

**7.- Sobredosis**

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, mareos, dolor de cabeza severo o continuo, tintineo o zumbido en los oídos en forma continua, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

