

Nombre: Alantoina - Cetilpiridinio Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiséptico bucofaríngeo Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para aliviar infecciones leves que afectan las mucosas de la boca y garganta.

Este medicamento puede aliviar los síntomas de la **faringoamigdalitis** pero no previene sus complicaciones.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utiliza un comprimido cada 2 horas. (2,5 mg cetilpiridinio con 10 mg de alantoina).

- Consejo de cómo administrarlo

Debe dejar disolver el comprimido lentamente en la boca. Se debe evitar comer y beber durante algunas horas después de usar el medicamento.

Es aconsejable que antes de utilizar este medicamento se lave los dientes, este medicamento actúa mejor si mantiene estas medidas de higiene.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten empeoran o aparece fiebre, después de un par de días de uso, debe acudir a la brevedad posible al médico. Puede estar desarrollando una enfermedad mas severa que requiera de otros medicamentos.

3.- Precauciones

- Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento, si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, la dosis debe ser señalada por su pediatra. No se recomienda utilizar este medicamento en niños menores de 3 años.

- Precauciones especiales

No debe enjuagarse la boca luego de tomar el medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cetilpiridinio y /o alantoína.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente blanqueadores dentales.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

- Alimentos

No debe ingerir alimentos al menos un par de horas después de haber utilizado el medicamento.

6. - Efectos adversos

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, náuseas o vómitos.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: irritación local, náuseas y vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.