

Nombre: Ácido acetilsalicílico – Cafeína – Cinamedrina** Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiespasmódico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el alivio de molestias **premenstruales** y **menstruales**, como **espasmos** musculares, inflamación, fatiga y dolor de cabeza.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utilizan 450 mg de ácido acetilsalicílico + 30 mg de cafeína + 15 mg de cinamedrina cada 4 horas. Máximo 8 dosis al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo en conjunto con alimentos o con un vaso lleno de agua, para evitar la irritación estomacal.

- Uso prolongado

No debe tomar este medicamento por más de 7 días seguidos. Si después de este tiempo los síntomas persisten o empeoran debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con ácido acetilsalicílico – cafeína – cinamedrina.

- Consumo de alcohol

Si usted toma alcohol durante el tratamiento con este medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y **hemorragias**.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño. No se recomienda su uso en niños menores de 12 años.

- Precauciones especiales

Este tipo de medicamentos interfiere en la **coagulación** de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos cinco días antes de someterse algún tipo de cirugía, a menos que su médico indique lo contrario.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a ácido acetilsalicílico , cafeína y /o cinamedrina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente algún medicamento para la presión, gota como **analgésicos**, artritis, anticoagulantes como warfarina, medicamentos para la diabetes como glibenclamida, prednisona.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, desordenes sanguíneos, **insuficiencia cardiaca congestiva**, **diabetes**, gota, **hemofilia**, alta presión sanguínea, enfermedades a los riñones, hígado, tiroides o **ulcera péptica**.

- Alimentos

Al tomar en conjunto con alimento o bebidas que contengan cafeína, se puede ver aumentado el efecto de excitación, insomnio.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: vómitos, agitación, fatiga extrema, confusión; reacción alérgica con dificultad para respirar, pérdida del color en la cara, escalofríos, hinchazón de la cara, ojos o párpados.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mal estar estomacal, enrojecimiento, nauseas leves, tintineo en los oídos, **insomnio**.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: nauseas, desorientación, vómitos, fiebre, dificultad para respirar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.