

ADEFOVIR DIPIVOXILO COMPRIMIDOS 10mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición :

Cada comprimido contiene:

Adefovir dipivoxilo: 10 mg

Excipientes: Según lo aprobado en Registro

Clasificación: Antiviral

Recomendaciones de uso:

Tratamiento de la hepatitis B crónica en adultos con:

- enfermedad hepática compensada con evidencia de replicación viral activa, niveles de alanina aminotransferasa (ALT) elevados persistentemente y evidencias histológicas de inflamación hepática activa y fibrosis.

- Enfermedad hepática descompensada

Úsese bajo estricto control médico.

Advertencias y precauciones:

Antes de usar este medicamento deben sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

Embarazo: El uso durante el embarazo debe ser sólo bajo estricto control médico

Lactancia: No se recomienda su administración durante la lactancia

Niños: No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en pacientes menores de 18 años de edad..

Ancianos: No se ha establecido la seguridad y eficacia de dipovixilo de adefovir en pacientes mayores de 65 años de edad.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está consumiendo ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de productos que contienen:

Aminoglicósidos (por ejemplo: gentamicina, amikacina, etc), ciclosporina, analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos usados para tratar el dolor y/o la inflamación), tacrolímús, vancomicina, otros fármacos antivirales (por ejemplo: abacavir, lamivudina, zidovudina, didanosina, estavudina, tenofovir, zalcitabina, etc.)

Consulte a su médico o farmacéutico si mientras está utilizando este medicamento se le presenta algún nuevo problema de salud, así como antes de empezar con cualquier otro medicamento.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

Enfermedad renal (riñones).

Enfermedad hepática (hígado)

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Efectos Adversos (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si le ocurre algunos de los siguientes signos: aparición de sangre en la orina o evidencia de presencia de azúcar en la orina.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico, entre ellos: dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida de fuerzas, acidez estomacal, eructos, hinchazón gastrointestinal, diarrea, indigestión, náuseas.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado anteriormente, consulte a su médico.

Contraindicaciones:

- Pacientes con hipersensibilidad conocida al adefovir, al dipovixilo de adefovir o a cualquiera de los excipientes de la formulación

Forma de administración:

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de su médico. No use más o con mayor frecuencia que la indicada.

Dosis:

El médico debe indicarla posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

En adultos de 18 a 65 años la dosis recomendada es de 10 mg , una vez al día, tomado con o sin alimentos.

En caso de insuficiencia renal se requiere ajustar la dosis.

Presentación:

Según lo aprobado en Registro.

Condiciones de almacenamiento:

Según lo aprobado en Registro

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

REVISADO EL 17 DE ENERO DEL 2007