

<b>Nombre:</b> Ambroxol <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> Mucolítico, Expectorante. <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se usa para aliviar la tos producidas por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica causada por el cigarrillo, asma, enfisema o en toses secas.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

Dosis adultos y niños mayores de 12 años: 60 a 90mg. al día; 30mg cada 8 horas.

Niños mayores de 6 años: 15mg 3 veces al día.

Niños menores de 6 años: 0,5mg/Kg./ 1 día

#### - Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo con abundante líquido en el caso de los comprimidos, cuando se trata de jarabes se debe administrar con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta, luego se puede tomar algún líquido.

#### - Uso prolongado

Si persiste o se intensifica la tos después de 7 días de tratamiento consulte con su médico, ya que se puede estar ocultando una enfermedad severa.

### 3.- Precauciones

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Debe tomarlo bajo indicación médica y con precaución en el caso que alguna vez haya presentado convulsiones o tenga problemas neurológicos.

#### 4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento o a Bromhexina en otras ocasiones.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si se encuentra embarazada o en periodo de lactancia.

No debe utilizarlo para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, **asma**, **enfisema** o en toses secas.

#### 5. - Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente anticoagulantes como warfarina.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si ha presentado convulsiones, enfermedades neurológicas, **ulcera gastroduodenal**.

#### 6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico : **fatiga**, molestias gastrointestinales agudas o síntomas de alergia como enrojecimiento de la piel, picazón, **urticaria**.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: : náuseas, diarrea, vómitos, **vértigo** e **indigestión**, dolor de cabeza, sueño, agitación.

#### 7. - Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.