

<b>Nombre:</b> Amilorida - Furosemida <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> Diurético <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### 1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos es usada para el tratamiento de estados edematosos de diversa etiología.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 40 mg. de furosemida y 5 mg. de amilorida, tomando un comprimido por la mañana y si es necesario 2 comprimidos diarios juntos o en dosis parciales.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda no tomar el medicamento durante la noche para evitar molestias nocturnas por la necesidad de ir frecuentemente al baño.

#### Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

No deje de tomarlo sin consultar al médico previamente, aunque los síntomas hayan desaparecido.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con amilorida - furosemida.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe Conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada

No se deben utilizar diuréticos para disminuir el **edema** durante el embarazo.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede causar una mayor sensibilidad de su piel al sol, presentándose síntomas como picazón **rash**, decoloración de la piel, o quemaduras severas en la piel por el sol. Por lo que se recomienda no tomar sol en forma directa especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y utilizar un factor solar 15.

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control de **dopaje**.

No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico, ya que se puede presentar un empeoramiento de los síntomas de su enfermedad.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a amilorida y / o furosemida.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, ciclosporina, digoxina, sales de litio, medicamentos que contengan potasio, antibióticos en general, ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios, propanolol, atenolol, cimetidina, prednisona, digoxina, fenitoína, ranitidina, y teofilina.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus, gota, cálculos renales**, problemas menstruales, enfermedades **autoinmunes** como **lupus eritematoso**, trastornos de la audición, **pancreatitis**.

##### **- Alimentos**

Debe evitar consumir alimentos ricos en potasio como: plátanos, melones, frutas y jugos ácidos, paltas, papas, porotos verdes, nueces.

##### **- Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento. Puede alterar las concentraciones sanguíneas y en orina de **glucosa**; y los resultados de exámenes de **nitrogeno ureico** (BUN), **ácido úrico**, calcio, cloruro, magnesio, potasio y sodio sérico. Por lo que debe informar que esta utilizando este medicamento antes de realizarse algún examen.

#### **6.- Efectos adversos**

**Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: rash**, picazón intensa, sequedad de boca y garganta, dificultad para respirar, náuseas y vómitos, fatiga inusual, **heces negras, hiperglucemia** (fatiga, visión borrosa, náuseas, aumento en la frecuencia para orinar, sed).

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o

se intensifican: náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, mareos, dolor de cabeza, ataques de gota, calambres musculares, mareos, visión borrosa, **estreñimiento** y diarrea.

#### **7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, ritmo irregular del corazón, nerviosismo, entumecimiento de manos, pies o labios, dificultad para respirar, debilidad, **letargia**, confusión mental, calambres musculares.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.