

Nombre: Amitriptilina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antidepresivo tricíclico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento del síndrome depresivo mayor, enfermedad maníaco depresiva, depresión con signos vegetativos o melancólicos.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Al inicio del tratamiento una dosis de 25 mg. 3 veces al día, aumentarla luego gradualmente hasta llegar a una dosis de 150 mg. diarios repartidos en 3 tomas diarias.

- Consejo de cómo administrarlo

Si lo utiliza en una toma diaria, se recomienda que la tome preferentemente por la noche junto con la comida.

- Uso prolongado

Sólo puede utilizarlo bajo indicación y control médico periódico.

3.- Precauciones

- Mayores 60 años

En pacientes ancianos los efectos adversos pueden ser más severos, por lo que se deben utilizar dosis más bajas de lo habitual, según la indicación de su médico.

- Consumo de alcohol

Se debe evitar el consumo de alcohol, mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se pueden ver acentuados los efectos adversos de este.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede producir somnolencia y confusión, por lo que no debe conducir vehículos ni maquinaria peligrosa durante el tratamiento con amitriptilina.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 6 años, ya que son muy sensibles a los efectos adversos de amitriptilina.

- Precauciones especiales

Los efectos beneficiosos del medicamento pueden tardar un tiempo, por ello es muy importante que si usted no presenta mejoría inmediata **no abandone el tratamiento**.

Durante el tratamiento con amitriptilina pueden producirse mareos si cambia de postura bruscamente (por ejemplo: pararse rápidamente), lo cual puede prevenirse cambiando de postura lentamente.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, lo cual puede aliviarlo chupando caramelos.

Debe mantener un control periódico con su médico.

Debe evitar exponerse al sol durante el tratamiento con amitriptilina, ya que esta puede causar mayor sensibilidad al sol, incluso frente a exposiciones cortas puede provocar quemaduras y reacciones adversas en la piel.

Este medicamento puede afectar los niveles de azúcar en la sangre.

Antes de someterse a cualquier clase de cirugía, tratamiento dental, debe avisarle a su médico o dentista que está en tratamiento con este medicamento.

No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico debe indicarle como disminuir gradualmente las dosis.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, imipramina, maprotilina, mianserina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si usted consume algún otro antidepresivo como inhibidores de la MAO, fluoxetina, u otro antidepresivo tricíclico, en este caso, antes de iniciar el tratamiento consulte con su médico.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: cimetidina, clonidina, guanetidina, matizamidato, fenilpropranolamina, isoproterenol, efedrina, epinefrina, amfetaminas, fenilefrina, pimozide, metildopa, metirosina, metoclopramida, pemolina, prometazina, trimeprazina, o cualquier droga depresora del sistema nervioso central o inhibidores del apetito (para adelgazar).

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de abuso de alcohol, dificultad para orinar, **asma**, **desorden bipolar**, problemas estomacales o intestinales, **glaucoma**, **hipotiroidismo**, **hipertrofia prostática**, **esquizofrenia**, desordenes sanguíneos.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

confusión, latidos irregulares del corazón, **alucinaciones**, **fatiga** extrema o **somnolencia**, alteración de la visión, dificultad para respirar, **constipación**, dificultad para concentrarse,

dificultad para orinar, fiebre, **insomnio** extremo y persistente, pérdida de la coordinación y el balance, dificultad para hablar, pupilas dilatadas, dolor en los ojos, desmayos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **somnolencia**, mareos, dolor de cabeza, sequedad de boca, **fatiga**, sensibilidad a la luz, ganancia de peso, incremento del apetito, náuseas.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad para respirar, **fatiga** severa, confusión, **alucinaciones**, pupilas dilatadas, latidos del corazón irregulares, palpitaciones, fiebre y dificultad para concentrarse. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.