

Nombre: Amoxicilina Condición de venta: con receta médica retenida Clasificación: Antibiótico β -lactámico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es un tipo de antibiótico, destinado a tratar enfermedades producidas por **bacterias sensibles**, en diferentes partes del cuerpo tales como: oídos, nariz, garganta, tracto **genitourinario**, piel y tejidos blandos y vías respiratorias .

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 250 a 500mg. tres veces al día, con un máximo de 4,5 g. Diarios.

En el caso de gonorrea producida por *Neisseria gonorrhoeae* se deben tomar 3 g. De amoxicilina más 1 g. De probenecid tomados en una sola dosis.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Puede tomarlo con el estómago vacío, pero también se puede tomar en conjunto con las comidas para evitar la irritación del estómago y diarreas.

- Uso prolongado

Si usted utiliza amoxicilina por sobre el tiempo indicado por su médico puede aumentar el riesgo de adquirir otras infecciones. Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con amoxicilina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de amoxicilina.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se han realizado estudios suficientes que demuestren seguridad al utilizar este medicamento durante el embarazo, sin embargo no se han detectado problemas cuando ha sido necesario usarlo en embarazadas. Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante (causar diarreas, infecciones por hongos y reacciones alérgicas en los niños lactantes). Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si usted es propensa a tener **asma**, fiebre del heno, alergia a la picadura de abejas, y alergias en general, puede desarrollar más fácilmente alergia a los antibióticos. Avise a su médico si usted es alérgico a algún antibiótico.

Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto durante el tratamiento con amoxicilina, por lo que debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar el embarazo.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Si usted presenta diarrea severa, consulte con su médico antes de tomar algún medicamento para detener la diarrea.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado alergia a amoxicilina o a cualquier otro antibiótico.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: otros antibióticos, medicamentos para bajar la presión, diuréticos como furosemida, hidroclorotiazida, suplementos de potasio o medicamentos que contengan potasio, warfarina, antiinflamatorios-analgésicos, sulfapirazona, colestiramina, colestipol, **anticonceptivos** orales, metotrexato, probenecid, alopurinol o rifampicina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alergias, **asma**, **insuficiencia cardiaca congestiva**, desordenes estomacales (especialmente diarreas cuando se utilizan antibióticos), o daño en la función renal.

- Exámenes de laboratorio

Puede causar falsos resultados en exámenes de orina para medir el azúcar en diabéticos, por lo que antes de realizarse un examen debe avisar que está en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

dificultad para respirar, dolor de cabeza ante la presencia de luz, desmayos repentinos, dolor articular, fiebre, dolor estomacal severo y calambres con diarrea sanguinolenta, reacción alérgica severa (marcada por hinchazón súbita de labios, lengua, cara o garganta; dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel, picazón), **hemorragias** o moretones inusuales, tinte amarillento en la piel u ojos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: enrojecimiento de la piel, diarrea leve, náuseas, dolor de cabeza, inflamación vaginal, dolor o manchas blancas en la boca o en la lengua, disminución de la capacidad urinaria, escalofríos, debilidad, fatiga.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas severas, vómitos, diarrea, espasmos musculares.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad a temperaturas menores a 25°C.

Las formas farmacéuticas formuladas como suspensiones deben almacenarse a temperaturas de 5°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.