

<b>Nombre:</b> Atapulguita - Nifuroxazida <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antidiarreico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el tratamiento De:

- Diarreas agudas de origen bacteriano del niño y del adulto.
- Gastroenteritis y enterocolitis aguda.
- Shigellosis, salmonelosis y disenterias bacterianas.

**Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica**

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 200 mg. de nifuroxazida y 350 mg. de atapulguita cada 4 horas.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento con un vaso de agua, y debe evitar comer frutas y verduras durante el tratamiento.

#### - Uso prolongado

Una diarrea no debe durar más de 2 días, si esto ocurre o se presenta fiebre debe consultar, nuevamente, con su médico.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Las diarreas en pacientes ancianos pueden provocar una **deshidratación** severa por lo que se recomienda visitar a su médico para que él evalúe su estado

#### - Consumo de alcohol

No debe consumir alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que este puede empeorar su estado.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se debe administrar a recién nacidos.

#### - Precauciones especiales

Debe tomar bastante agua para evitar **deshidratarse** mientras se encuentre con diarrea. Si junto con la diarrea presenta sangre en las heces, náuseas, vómitos o fiebre debe consultar con su médico.

Debe tomar este medicamento con al menos 2 horas de otro medicamento, ya que este puede evitar la absorción y disminuir efecto de otros medicamentos.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nifuroxazida y / o atapulguita.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol,

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **disentería**

##### - Alimentos

Debe evitar consumir alimentos que pueden aumentar la diarrea, como: frutas, comidas picantes o fritas, salvado, golosinas y alimentos o bebidas que contengan **cafeína**.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor abdominal, vómitos, mareos, sequedad de boca, disminución de la cantidad de orina o de la frecuencia para orinar.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación.

#### 7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**  
**No recomiende este medicamento a otra persona.**