

Nombre: Azatioprina Condición de venta: con receta médica Clasificación: inmunosupresor Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se utiliza como tratamiento coadyuvante para prevenir el rechazo del injerto en trasplantes de órganos.

En el tratamiento de artritis reumatoide activa, severa y erosiva que no cede con los tratamientos convencionales como reposos, aspirina u otro AINE.

También se utiliza en enfermedades auto inmunes.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Al inicio de la terapia en pacientes trasplantados: 3 a 5 mg./kg/día la que se da por los tres primeros meses posterior al trasplante. Luego la dosis es reducida a 1-3 mg/kg/día.
- Para el tratamiento de la artritis reumatoidea: inicialmente 1 mg/kg como dosis única o dividida en dos dosis, la cual puede aumentarse si se tolera el medicamento hasta una dosis de 2 a 2.5 mg/kg/día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento en conjunto con las comidas o inmediatamente después de comer para reducir la irritación estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Su uso prolongado aumenta la posibilidad de que se presenten efectos adversos, el uso por periodos largos de tiempo debe ser bajo supervisión médica

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con azatioprina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de azatioprina.

- **Manejo de vehículos**

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- **Embarazo**

Las mujeres embarazadas no deberían consumir azatioprina, ya que puede causar daño al feto.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar problemas en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No existen precauciones especiales en niños, si se utiliza en las dosis adecuadas.

- **Precauciones especiales**

- Este medicamento debe usarse bajo control médico periódico.
- Informe a su médico si está consumiendo medicamentos como corticoesteroides o alopurinol.
- Tanto las mujeres como los hombres deben evitar **concebir** hijos durante el tratamiento con este medicamento, ya que azatioprina puede causar defectos en el niño.
- No debe recibir o administrarse ninguna vacuna que no haya sido autorizada por su médico.
- Debe evitar estar en contacto con personas que presenten alguna infección contagiosa, ya que este medicamento reduce la capacidad natural de su cuerpo para combatir infecciones.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de infecciones y retardar el proceso de cicatrización, los tratamientos dentales, en lo posible, deben ser completados antes de comenzar el tratamiento con este medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a azatioprina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alopurinol, enalapril, captopril, corticosteroides como prednisona, cotrimoxazol, ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **gota**, alguna infección, **pancreatitis**, **herpes zoster**, varicela.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, gripe, fiebre, dolor al orinar, heces negra o con sangre, dolor muscular o articular, náusea, vómitos, diarrea, manchas rojas en la piel, dolor de estómago severo, hemorragias o moretones inusuales, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: pérdida del apetito, náuseas o vómitos

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: hemorragias, fiebre, náusea, vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.