

Nombre: Azufre Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: antiacnéico - escabicida - queratolítico Disponible en:	Nombres de marca:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

El azufre está indicado para el tratamiento de la escabiosis (sarna) y del acné.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Para el tratamiento de acné: crema al 2 a 5 % 1 a 2 veces al día.

Para el tratamiento de escabiosis (sarna): crema al 5 a 10 % por 3 días.

- Consejo de cómo administrarlo

Para el tratamiento del acné debe aplicar sobre la piel limpia y seca.

Para el tratamiento de escabiosis (sarna) debe aplicar sobre la piel limpia y seca, en cantidad suficiente para cubrir toda la zona afectada, se recomienda aplicar durante la noche y repetir por 3 días.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado.

Las pomadas con más de un 5% de azufre no se deben usar por más de 3 días sin consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Es conveniente que consulte a su médico la seguridad de usar este medicamento si usted se encuentra embarazada.

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca o dentro de la nariz.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a azufre.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si presenta lesiones en la zona de la piel afectada (por ejemplo heridas profundas).

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. Particularmente si está utilizando preparaciones de uso tópico que contengan resorcinol, peróxido de benzoilo, ácido salicílico, tretinoína, alcohol.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, enrojecimiento, **exfoliación** de la piel.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.