

Nombre: Bacitracina - Neomicina Condición de venta: con receta médica de uso tópico Clasificación: antibiótico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en la prevención y tratamiento a corto plazo de infecciones cutáneas en heridas leves causadas por gérmenes sensibles.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar una cantidad suficiente de crema en el área afectada cada 8 horas.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar cubriendo toda la zona afectada. Si su médico lo indica puede poner un apósito sobre la lesión.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar nuevamente con su médico.

Debe evitar aplicar en zonas demasiado extensas, ya que se puede absorber el medicamento y causar efectos adversos no deseados.

Debe evitar aplicar este medicamento en los ojos.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a bacitracina y /o neomicina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de perforación del tímpano, **miastenia gravis**, **enfermedad de Parkinson**.

- **Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: disminución de la audición, disminución en la frecuencia para orinar y en la cantidad de orina, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre áreas extensas de la piel, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: pérdida de la audición, **hematuria**, respiración dificultosa, mareos, **somnolencia**, aumento o disminución en el volumen de orina, aumento de la sed, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, tinnitus, debilidad.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.