

Nombre: Betametasona -Lidocaína - Neomicina - Polimixina B Condición de venta: con receta médica de uso ótico Clasificación: antiséptico ótico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos está indicada en el tratamiento de la otitis media aguda y crónica, tratamiento local de la mastoiditis y como coadyuvante del tratamiento sistémicos de infecciones óticas.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar 2 a 3 gotas 2 a 3 veces al día en el conducto auditivo o en la superficie externa del oído afectado.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar en el canal auditivo (este se debe encontrar limpio y seco), se recomienda taponar el oído con algodón luego de la aplicación.

No debe calentar la solución antes de aplicarla.

- Uso prolongado

Este medicamento no se debe usar por periodos prolongados de tiempo.

Si los síntomas persisten o empeoran después de un par de días consulte con el médico

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Estos pacientes son mas sensibles a los efectos adversos del medicamento, el médico debe ir evaluando cuidadosamente la cantidad a aplicar y la frecuencia.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento se **absorbe** por la piel y puede dañar al feto, por lo que debe hablar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento es absorbido por la piel y puede pasar a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años, ya que la piel de los niños es más susceptible a absorber este medicamento y presentar mayor sensibilidad a los efectos adversos del medicamento.

- **Precauciones especiales**

Este medicamento no debe utilizarse por más de 10 días.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento no sirve para tratar infecciones causadas por virus u hongos.

Debe consultar a su médico, antes de aplicarse este medicamento, si ha presentado síntomas de alergia a preservantes.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a betametasona, neomicina, polimixina B, lidocaína u otro anestésico de uso tópico.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de perforación del tímpano, **miastenia gravis, enfermedad de Parkinson, varicela, herpes simple, herpes zoster, tuberculosis.**

- **Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: aparición de infecciones por hongos, disminución de la audición, disminución en la frecuencia para orinar y en la cantidad de orina, ardor y picazón del oído, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera

de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, aparición de ampollas o erupciones, cambios del color de la piel, excesivo crecimiento de pelo en la zona, sensación de quemazón y picor, disminución del espesor de la piel.

7. - Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, temblores, zumbido de oídos, ritmo irregular del corazón, dificultad para respirar, ansiedad, excitación, nerviosismo, pérdida de la audición, **hematuria**, respiración dificultosa, mareos, **somnolencia**, aumento o disminución en el volumen de orina, aumento de la sed, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, tinnitus, debilidad.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.