

<b>Nombre:</b> Bicarbonato de sodio <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> antiácido <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el alivio temporal de la acidez estomacal

#### 2.- Administración (oral)

- **Rango y frecuencia**

Dosis adultos: 325 mg a 2g 1 a 4 veces al día.

- **Uso prolongado**

No debe utilizar este medicamento por más de 2 semanas sin indicación médica, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico, puede tratarse de una enfermedad seria

#### 3.- Precauciones

- **Consumo de alcohol**

El consumo de alcohol disminuye el efecto de este medicamento, por lo que no debe beber alcohol durante el tratamiento. Por otra parte el alcohol es irritante del estomago y puede empeorar su mal estar.

- **Embarazo**

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**, no obstante su uso por periodos prolongados y/o en grandes cantidades puede dañar al feto. Si usted retiene agua, los medicamentos como éste que contienen sodio deben ser evitados ya que aumentan su problema.

- **Lactancia**

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- **Lactantes y niños**

No se debe usar antiácidos en niños menores de 6 años, a menos que su pediatra lo indique.

- **Precauciones especiales**

Si los síntomas de acidez persisten en el tiempo debe consultar con su médico, ya que el uso frecuente de antiácidos podría ocultar una enfermedad más grave.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si presenta síntomas de apendicitis o de intestino inflamado.

Dentro de 1 a 2 horas o más de haber tomado otros medicamentos por vía oral.

## 5. - Interacciones

### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. Este medicamento altera la absorción de otros medicamentos. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ketoconazol, tetraciclina, amfetaminas, metoclopramida, quinidina, ciprofloxacino, hierro, sales de litio, metotrexato, sucralfato, salicilatos.

### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **apendicitis** o de **inflamación** intestinal, hemorragia rectal o intestinal, hipertensión, problemas para orinar, **toxemia del embarazo**.

### - Alimentos

Si le han indicado una dieta baja en sal, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento.

## 6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: aumento en la frecuencia para orinar, dolor de cabeza, pérdida del apetito, dolor muscular, náuseas, vómitos, nerviosismo, dificultad para respirar, fatiga inusual.

### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sabor a tiza o yeso en la boca, **constipación** suave, calambres estomacales.

## 7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: aumento en la frecuencia para orinar, dolor de cabeza, pérdida del apetito, dolor muscular, náuseas, vómitos, nerviosismo, dificultad para respirar, fatiga inusual.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

## 8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

## **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.