

<b>Nombre:</b> Biperiden <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antiparkinsoniano <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de todas las formas del síndrome parkinsoniano (idopático, postencefálico, arterioesclerótico) y para reacciones extrapiramidales secundarias al uso de fármacos.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Para el **tratamiento del parkinson** se recomienda iniciar la terapia con una dosis de 1 mg. de biperiden 2 veces al día, aumentando gradualmente de acuerdo a las necesidades del paciente en incrementos de 2 mg. La dosis de mantención óptima varía entre los 3-12 mg. al día. la dosis máxima diaria no debe superar los 16 mg.
- Para el manejo de los **síntomas extrapiramidales** inducidos por medicamentos se recomienda una dosis de 1-4 mg. 1 a 4 veces al día.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento junto con las comidas o inmediatamente después de haber comido.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con biperiden. Se pueden presentar síntomas como pesadillas o alucinaciones, agitación, confusión, desorientación, pérdida de la memoria.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de biperiden.

#### - Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que biperiden puede causar en algunas personas visión borrosa, mareos o pérdida de la capacidad de alerta.

#### - Embarazo

Este medicamento puede alcanzar al feto, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, además puede disminuir el flujo de leche, por lo que debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

Los niños son especialmente sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el **riesgo/beneficio** de su administración.

#### - Precauciones especiales

Debe poner especial precaución en el cuidado de sus dientes, ya que beperiden disminuye la secreción de saliva, por lo cual pueden aparecer con mayor facilidad caries en su dentadura. Biperiden puede causar una mayor sensibilidad de sus ojos a la luz, por lo que puede utilizar anteojos de sol para evitar molestias.

Usted no debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico le señalará la forma de ir reduciendo la dosis.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a beperiden .

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: metoclopramida, diazepam, alprazolam, fenobarbital, imipramina, amantadina, digitoxina, antiácidos.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **glaucoma**, convulsiones, **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **hipertensión**, bloqueo **gastrointestinal**, **miastenia gravis**

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: confusión, **rash**, dolor de los ojos.

##### Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o

se intensifican: visión borrosa, **constipación**, dificultad para orinar, somnolencia, sequedad de la boca, nariz o garganta, mayor sensibilidad de los ojos a la luz, náuseas y vómitos leves.

#### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia, sequedad de la boca, nariz o garganta, aumento en el ritmo de los latidos cardíacos, alucinaciones, convulsiones, dificultad para respirar, problemas para dormir, calor, sequedad y enrojecimiento de la piel.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**