

**Nombre:** Cafeína - Ergotamina -Metamizol sódico

**Condición de venta:** con receta médica

**Clasificación:** antimigrañoso

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- Composición y presentación:
- Principio Activo:
- Excipientes:

### 1. - ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento y alivio de cefaleas vasculares (migrañas).

### 2. - Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 2 mg. de ergotamina, 600 mg. de metamizol sódico, 200 mg. de cafeína (2 comprimidos) al inicio de la migraña y luego 1 comprimido cada 1/2 hora, si es necesario, hasta el alivio de los síntomas, pero con un máximo de 4 comprimidos al día y 10 comprimidos a la semana

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con las comidas para evitar mal estar estomacal.

Para aumentar la efectividad del medicamento se recomienda que tome el medicamento en cuanto sienta los primeros signos de mal estar. Debe quedarse tranquilo, idealmente en una habitación oscura hasta que se sienta mejor.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. No debe utilizar este medicamento durante un periodo prolongado o en altas dosis, a menos que su médico lo haya indicado.

Si utiliza este medicamento por un tiempo prolongado, puede perder su efectividad y causar dependencia física, lo cual puede provocar que los dolores de cabeza reaparezcan.

### 3. - Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con la asociación de cafeína, ergotamina y metamizol sódico.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de la asociación de cafeína, ergotamina y metamizol sódico (dipirona).

#### - Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto** incluso la muerte de este, por lo que no debe

tomarse este medicamento durante el embarazo

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar vómitos, diarrea, cambios en el pulso, convulsiones y problemas para dormir en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

#### - Lactantes y niños

Los niños son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño. No debe utilizarse en niños menores de 12 años.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debe evitar fumar cigarrillos, ya que esto puede aumentar la intensidad de los dolores de cabeza o la aparición de estos.

Durante el tratamiento con este medicamento puede aumentar su sensibilidad al frío, ya que disminuye el flujo de sangre hacia la piel y los dedos de pies y manos, por lo que se recomienda utilizar ropa abrigada.

Debe avisar a su médico si presenta síntomas como fiebre y ulceraciones bucales.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cafeína, ergotamina y / o metamizol sódico (dipirona).

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si padece de **porfiria hepática** o déficit congénito de glucosa-6-fosfato -dehidrogenasa.

Si sufre de enfermedad coronaria o hipertensión arterial severa.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: epinefrina, dihidroergotamina, clorpromazina, ciclosporina, fenilbutazona, warfarina, quinidina, alcohol.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **agarofobia**, ataques de pánico, **ulcera estomacal**, problemas para dormir, diarrea, dificultad para orinar, **hipertrofia prostática**, **glaucoma**, **hipertensión**, alguna infección, bloqueo intestinal, picazón severa, depresión, **hipertiroidismo**, bloqueo urinario, **asma**, **taquiarritmias**, **megacolon**, **agranulocitosis**.

##### - Alimentos

No se recomienda comer o tomar bebidas, en grandes cantidades, que contengan cafeína como bebidas cola, café, té, etc.

##### - Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento, ya que cafeína puede alterar los resultados de algunos exámenes.

Metamizol sódico puede alterar los resultados de exámenes de **glucosa** en orina, por lo que debe avisar que se encuentra tomando este medicamento antes de practicarse el examen.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse

**debe acudir en forma inmediata al médico:** ansiedad confusión severa, cambios en la visión, dolor de pecho, dolor en los brazos, piernas o en la parte inferior de la espalda, palidez, manos y pies azulados, ampollas rojas o violetas en la piel, las manos o los pies, convulsiones, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, mareos, somnolencia o debilidad, fiebre, ulceraciones bucales, anales o genitales, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, molestias para tragar, sudor frío, **vértigo**, náusea, pérdida del color de la piel, dificultad para respirar, inflamación de la cara, prurito, **taquicardia**.

#### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, náusea y vómitos leves, mareos o somnolencia, nerviosismo, sequedad de boca, orina de color rojizo.

#### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: latidos del corazón más rápidos o más lentos, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, excitación, escalofríos, vértigo, náuseas, disminución en la frecuencia para orinar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**