

Nombre: Carbón Sulfaguanidina Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antidiarréico - antiifecioso Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de diarreas por infecciones intestinales leves a moderadas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utilizan dosis de Sulfaguanidina 127 mg; Carbón Activado 127 mg.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento con un vaso de agua, y debe evitar comer frutas y verduras durante el tratamiento.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten o empeoran debe consultar con su médico, ya que puede que su problema requiera de otro tratamiento y debe ser evaluado por su médico

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Las diarreas en pacientes ancianos pueden provocar una **deshidratación** severa por lo que se recomienda visitar a su médico para que él evalúe su estado.

- Consumo de alcohol

No debe consumir alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que este puede empeorar su estado.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Sólo puede usar este medicamento en niños bajo indicación médica.

- **Precauciones especiales**

Debe tomar bastante agua para evitar **deshidratarse** mientras se encuentre con diarrea.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a las **sulfonamidas**.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente con este medicamento ya que puede absorber la mayoría de los fármacos e impedir que los medicamentos actúen debidamente.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de ulceraciones **gastrointestinales**, **colitis ulcerativa** crónica.

6.- Efectos adversos

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **estreñimiento**, **heces** oscuras o negras.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.