

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <p><b>Nombre:</b> Clorhexidina enjuague bucal</p> <p><b>Condición de venta:</b> sin receta médica</p> <p><b>Clasificación:</b> antiséptico bucofaríngeo</p> <p><b>Disponible en:</b></p> | <p><b>Nombres de marca:</b></p> |
|--|---------------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como antiséptico de uso tópico para las lesiones leves de la mucosa bucal, también es usado en el tratamiento de la gingivitis y la prevención de infecciones en intervenciones odontológicas.

### 2.- Administración (tópico)

#### - Rango y frecuencia

Se debe enjuagar la boca durante 30 segundos (luego escupir), 2 veces al día con 10 mL de solución.

#### - Consejo de cómo administrarlo

La solución de clorhexidina es exclusivamente para uso local y no debe tragarla.

El enjuague lo debe realizar luego de cepillar los dientes, para evitar la manchas que se pueden producir sobre estos.

Debe evitar comer y beber durante algunas horas después de usar el medicamento.

#### - Uso prolongado

Si los síntomas no mejoran o empeoran, luego de un par de días, debe consultar con su médico.

No se recomienda que utilice este medicamento por más de 7 días seguidos, a menos que su médico indique lo contrario.

### 3.- Precauciones

#### - Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento, si está embarazada.

#### - Lactancia

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

No se recomienda utilizar la solución de clorhexidina en niños menores de 6 años y sólo se debe utilizar bajo indicación de su pediatra.

#### - Precauciones especiales

En caso que utilice dentadura postiza, se recomienda que lave la dentadura y la sumerja en la solución de clorhexidina durante 15 minutos, dos veces al día.

En caso que se produzca descamación de la mucosa bucal se recomienda que utilice la solución de clorhexidina disuelta en agua.

#### **4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a clorhexidina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### **5. - Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente blanqueadores dentales.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

##### **- Alimentos**

No debe ingerir alimentos al menos un par de horas después de haber utilizado el medicamento.

#### **6. - Efectos adversos**

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sensación de quemazón bucal, irritación, coloración de las superficies orales, alteraciones del gusto y descamación de la mucosa oral.

#### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sensación de estar bajo los efectos del alcohol (mareos, dificultad para hablar, etc.), náuseas, vómitos y dolor estomacal. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.