

Nombre: Sulfametoxazol – Trimetoprim (co-trimoxazol) Condición de venta: con receta médica Clasificación: antiinfeccioso Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado para el tratamiento de infecciones de las vías urinarias altas y bajas no complicadas, infecciones de las vías respiratorias, infecciones del aparato genital y gastrointestinal. También se usa en el tratamiento y profilaxis de neumonía causada por *pneumocystis carinni*.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

adultos:

- ❖ Infecciones del tracto urinario: 160 mg. de trimetoprima/800 mg. de sulfametoxazol por 10-14días.
- ❖ Tratamiento de crisis aguda de bronquitis crónica: 160 mg. de trimetoprima/800 mg. de sulfametoxazol cada 12 horas por 14 días.
- ❖ Shigellosis: 160 mg. de trimetoprima/800 mg. de sulfametoxazol por 5 días.
- ❖ Neumonía por *pneumocystis carinni*: 20 mg/Kg de trimetoprima/100mg/Kg. de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días.

niños:

- ❖ Neumonía por *pneumocystis carinni*: 20 mg/Kg de trimetoprima/100mg/Kg. de sulfametoxazol en 4 dosis iguales cada 6 horas por 14-21 días.
- ❖ Otitis media e infecciones urinarias: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 10 días.
- ❖ Shigellosis: 8 mg/kg de trimetoprima/40 mg/kg de sulfametoxazol cada 24 horas repartidos en 2 dosis iguales cada 12 horas por un período de 5 días.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Se recomienda que tome el medicamento en conjunto con un vaso de agua, co-trimoxazol puede ser tomado junto con las comidas para evitar malestar estomacal..

- **Uso prolongado**

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3. - Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con co-trimoxazol.

- **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de co-trimoxazol.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

No se recomienda que utilice este medicamento en niños menores de 2 meses de vida. El uso de este medicamento en niños mayores de esa edad debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Este medicamento puede aumentar la sensibilidad a la luz solar, por lo que debe evitar las exposiciones prolongadas al sol, durante el tratamiento con este medicamento.

Los pacientes afectados por el síndrome de deficiencia adquirida (**SIDA**) pueden ser más sensibles a los efectos adversos del medicamento, especialmente **rash**.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Tome el medicamento por la totalidad del período indicado por su médico aunque sienta que los síntomas hayan desaparecido.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a sulfametoxazol, trimetoprim u otros medicamentos del grupo de las sulfas como algunos medicamentos para la diabetes.

Si ha presentado síntomas de alergia a algunos de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ciclosporina, metotrexato, fenitoína, procainamida, glibenclamida o warfarina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **anemia** causada por un déficit de ácido fólico.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **rash**, sequedad de garganta, fiebre, dolores **articulares**, palidez, manchas rojas sobre la piel, moretones o **hemorragias** inusuales.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, pérdida del apetito, reacciones alérgicas sobre la piel, picazón.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: pérdida del apetito, náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, **somnolencia**, depresión, confusión, pérdida de la alerta mental, fiebre, sangre al orinar, piel u ojos amarillos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.