

CICLOBENZAPRINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 20 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

1.-Composición:

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene:
Ciclobenzaprina clorhidrato: 20 mg
Excipientes: Según lo aprobado en el Registro

2.-Clasificación: Relajante Muscular

3.-Indicaciones:

Tratamiento sintomático y coadyuvante en la terapia de reposo y física para el alivio del espasmo muscular asociado a condiciones músculo esqueléticas agudas

4.-Precauciones - Advertencias:

- Alergias: Debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento u otro componente de la formulación.
- En ancianos: se puede incrementar el riesgo de los efectos adversos, por lo tanto, se puede utilizar con precaución y con la menor dosis posible.
- No se recomienda el uso en menores de 15 años, a menos que su médico lo indique.
- Debe utilizarse con precaución en pacientes con daño hepático leve y su uso no es recomendado en el paciente con daño hepático moderado y severo.
- Se debe utilizar con precaución en pacientes que tienen historia de retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado, o incremento de la presión intraocular o en pacientes que reciben drogas anticolinérgicas.
- Los pacientes deben tener precaución para manejar vehículos o maquinarias ya que puede verse alterada la alerta mental y la coordinación física.
- Debe ser usado por períodos cortos
- No repita el tratamiento sin indicación médica.
- No recomiende este medicamento a otra persona.
- La suspensión del tratamiento debe realizarla poco a poco, según las indicaciones de su médico, ya que de lo contrario podría presentar malestar general, dolor de cabeza y náuseas.
- Este medicamento puede causar sequedad de boca, lo cual puede aliviarse chupando caramelos.

5.-Contraindicaciones:

Está contraindicado en hipersensibilidad conocida al principio activo u otros ingredientes de la formulación.

Contraindicado en pacientes con hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias, desórdenes en la conducción o bloqueo cardíaco, y en la fase de recuperación siguiente a un infarto al miocardio agudo.

Contraindicado en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales no pueden utilizar ciclobenzaprina hasta discontinuar a lo menos 14 días la terapia con estos agentes.

No usar en Embarazo y Lactancia, se debe administrar sólo si es estrictamente necesario.

6.-Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones).

Debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, MAO (deben pasar por lo menos 14 días entre la última dosis de inhibidores de la MAO y la primera de ciclobenzaprina).

Evitar el consumo de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central mientras está bajo tratamiento.

7.-Efectos Adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención de orina, confusión, dolor muscular, temblor, alucinaciones, depresión, dificultad para respirar, taquicardia.

Los efectos adversos comúnmente observados son: somnolencia, sequedad bucal, vértigo - mareo, fatiga y dolor de cabeza.

8.-Vía de administración y dosis :

Vía oral

El médico debe indicar la posología y el tiempo de uso apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de:

En pacientes mayores de 15 años y adultos se recomienda la dosis de 1 comprimido al día con o sin alimentos.

Se puede utilizar por una semana, no se recomienda su uso por un período más largo.

No se recomienda la administración en el paciente que sufre daño hepático moderado a severo. En daño hepático leve se puede administrar con precaución, comenzando con la dosis más baja. En el anciano se recomienda comenzar con la dosis más baja.

9.-Sobredosis:

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como convulsiones, somnolencia severa, desmayos o latidos cardiacos rápidos o irregulares, respiración dificultosa, alucinaciones, aumento o disminución de la temperatura corporal, rigidez muscular inexplicable, nerviosismo, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado

10.-Presentación:

Según lo aprobado en Registro

11-Condiciónes de Almacenamiento:

Según lo aprobado en Registro

Revisado el 26 de Diciembre del 2006