

<b>Nombre:</b> Cisaprida <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> estimulante gastrointestinal <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en pacientes adultos con enfermedad de reflujo gastroesofágico que no responden adecuadamente a otras terapias.

#### 2.- Administración (oral)

##### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 10 mg. 4 veces al día

##### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome cisaprida 15 minutos antes de las comidas, junto con alguna bebida (excepto jugo de pomelo) y antes de acostarse, cuando sea necesario.

##### - Uso prolongado

El uso prolongado o permanente de este medicamento sólo debe realizarlo bajo la indicación y control de su médico

#### 3.- Precauciones

##### - Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser más severas en pacientes ancianos, por lo que se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis menor, según las indicaciones de su médico.

##### - Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento.

##### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas **somnolencia**, mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

##### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

##### - Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

Este producto es para uso sólo en personas adultas, no debe ser usado en niños.

- **Precauciones especiales**

Se han reportado casos de **arritmias** severas que incluyen **taquicardia ventricular**, **fibrilación ventricular**, **torsade de pointes** y **prolongación del QT** asociados al uso de cisaprida, por esto no debe tomarlo si su condición predispone a la aparición de **arritmias cardiacas**, o si toma medicamentos que interfieran con cisaprida para agravar esta situación.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a la cisaprida, cinitaprida, cleboprida, domperidona o metoclopramida.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

No debe ser usado en pacientes con tratados con antibióticos macrólidos, antimicóticos, antiaritmicos, antidepresivos, inhibidores de la preteasa del VIH, antialérgicos, antieméticos y antipsicóticos.

Si padece de daño renal o hepático.

Pacientes con alteraciones cardiovasculares deben informar al médico de su condición, existen ciertas enfermedades cardiovasculares en las cuales no se puede tomar este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado en niños.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: claritromicina, eritromicina, acenocumarol, warfarina, ketoconazol, itraconazol, ciclosporina, cimetidina, diazepam, indinavir y ritonavir.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna alteración cardiovascular, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal o perforación intestinal, úlcera de estómago o duodeno, bajos niveles en sangre de sodio, calcio o magnesio.

- **Alimentos**

No debe tomar jugo de pomelo mientras está en tratamiento con cisaprida, ya que podría aumentar la probabilidad de que se produzcan los efectos no deseados de cisaprida.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **arritmia** severa incluyendo **taquicardia**, visión borrosa, convulsiones.

**Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, náuseas, **estreñimiento**.

#### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: ruidos abdominales, aumento en la frecuencia para orinar, exceso de gas. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.