

Nombre: Clindamicina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiotico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones crónicas tales como sinusitis, otitis media, faringoamigdalitis causadas por microorganismos sensibles a clindamicina.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos:

- ❖ Infecciones leves o moderadamente graves: 150-300 mg. cada 6 horas.
- ❖ Infecciones graves: 300-450 mg. cada 6 horas.

Niños:

- ❖ Infecciones leves o moderadamente graves: 8-16 mg/kg/día repartidos en 3 o 4 veces al día .
- ❖ Infecciones severas: 16 -20 mg/kg/día divididos en 3 o 4 dosis diarias.

Tratamiento de faringitis estreptocócica:

- ❖ 300 mg. para adultos 150 mg. para niños en 2 dosis diarias.
- ❖ En Infecciones por estreptococos beta hemolíticos el tratamiento se debe continuar por lo menos por 10 días.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar con un vaso de agua en conjunto con las comidas para evitar la irritación estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

- **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de clindamicina.

- **Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**.

- **Lactancia**

No se han reportado efectos sobre el lactante, no obstante consulte con el médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Antes de que le apliquen anestesia general, su médico o su dentista, debe informar que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Informe a su médico si está en tratamiento con eritromicina.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clindamicina, lincomicina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: cloramfenicol, atapulguita, eritromicina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **colitis** o alguna otra enfermedad estomacal.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: calambres estomacales, diarrea severa, heces con sangre, fiebre, **rash**, picazón, aparición de moretones inusuales.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea leve, náuseas y vómito leves, dolor de estómago, picazón del ano o el área genital.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres estomacales, diarrea severa, heces con sangre, fiebre, **rash**, picazón, aparición de moretones inusuales.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.