

<b>Nombre:</b> Clobutinol <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antitusivo <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado para el tratamiento sintomático de la tos no productiva.

### 2.- Administración

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Niños de 1 a 3 años: 10 a 20 mg. de clobutinol cada 8 horas.

Niños de 3 a 6 años: 20 a 30 mg. de clobutinol cada 8 horas.

Niños de 6 a 12 años: 30 a 40 mg. de clobutinol cada 8 horas.

Niños mayores de 12 años y adultos: 40 -80 mg. de clobutinol cada 8 horas.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Debe utilizar el medicamento según indique su médico, sin utilizar dosis mayores o con mayor frecuencia a la indicada por su médico.

#### - Uso prolongado

Si la tos continúa luego de unos días de tratamiento debe consultar nuevamente con su médico.

### 3.- Precauciones

#### - Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que se acentúan los efectos depresores del sistema nervioso.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

#### - Lactantes y niños

No debe administrarse en niños menores de 1 año, la dosis debe ser establecida por su pediatra en base a los kilogramos de peso del niño..

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clobutinol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si presenta tos productiva o tos asociada a asma.

Si se encuentra dentro del primer trimestre de embarazo.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: codeína, morfina, fluoxetina, penicilina, teofilina, alprazolam, zolpidem, clorfenamina, fenobarbital.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de tos asmática, **epilepsia**, antecedentes convulsivos, insuficiencia respiratoria.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **erupción** cutánea, picazón de la piel, náuseas, vómitos, dificultad para respirar.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **somnolencia**, **insomnio**, mareos, temblor.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **miosis**, vómitos, **vértigo**, agitación, **somnolencia**, temblores, convulsiones. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.

