

Nombre: Cloruro de estroncio Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: desensibilizante dental Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el alivio del dolor leve a moderado de encías y dientes.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Se debe aplicar 2 a 3 veces al día, por 8 semanas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe cepillar sus dientes con este dentífrico con un cepillo dental suave.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que lo recomendado. Si los síntomas persisten después de 8 semanas consulte con su dentista

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Es poco probable que este medicamento, cause daño al **feto**, no se han reportado problemas por su uso durante el embarazo

- Lactancia

No se han reportado problemas con el uso de este medicamento durante la lactancia.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta al dentista.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su dentista.

Este medicamento no debe ser ingerido.

4. - Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cloruro de estroncio.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5. - Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque el riesgo de interacciones es bajo.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7. - Sobredosis

En el caso de ingerir por casualidad este medicamento debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona