

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre: Cloxacilina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiótico betalactamico Disponible en: | Nombres de marca: |
|--|--------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está destinado al tratamiento de infecciones de la piel y endocarditis causadas por bacterias sensibles específicamente aquellas causadas por estafilococos.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- ❖ Adultos y niños sobre 20 Kg.: 250-500mg. cada 6 horas.
- ❖ Niños bajo los 20 Kg.: 50 a 100 mg/kg/día cada 6 horas.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento con un vaso de agua y con el estómago vacío, por lo menos una hora antes o dos horas después de las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Embarazo

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Cloxacilina pasa a la leche materna, y puede producir reacciones alérgicas, diarrea, infecciones por hongos y rash cutáneo en los niños. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si se encuentra tomando **anticonceptivos** orales con estrógenos el uso de cloxacilina puede disminuir el efecto de los anticonceptivos, por lo que se recomienda utilizar otro método **anticonceptivo** (no hormonal), durante el tratamiento con cloxacilina.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Antes de una cirugía, incluyendo una dental indique a su médico o dentista que está en tratamiento con cloxacilina.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cloxacilina u otros antibióticos del tipo penicilina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alopurinol, **anticonceptivos** orales, cloranfenicol, fenitoina, probenecid, tetraciclinas, anticoagulantes orales como warfarina, AINES, atenolol.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades **gastrointestinales**, **colitis ulcerosa**.

- Exámenes de laboratorio

Puede alterar los resultados de concentraciones séricas de **aspartato aminotransferasa** (SGOT), por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **rash** cutáneo, **urticaria**, **prurito** o **silibancias**.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea leve, dolor de la boca.

7. - Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.