

Nombre: Dexametasona -

Tobramicina

Condición de venta: con receta
médica retenida

Clasificación: antibiótico

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1. - ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en condiciones inflamatorias oculares, en las cuales exista además una infección ocular bacteriana superficial o el riesgo de la misma.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2. - Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 1 a 2 gotas en el (los) ojo(s) afectado(s) cada 2 horas por 24 a 48 horas. La dosis puede ser reducida a 1 a 2 gotas cada 4 a 6 horas.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes y después de aplicar el medicamento debe lavarse las manos.

Debe aplicar el medicamento sobre la **conjuntiva**, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota o aplicar la crema sobre el ojo, luego debe mantener los ojos cerrados por 1 a 2 minutos para permitir una mejor distribución del medicamento. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

- Uso prolongado

Debe visitar regularmente a su médico durante el tratamiento con este medicamento.

El uso prolongado de corticoides oftálmicos puede provocar la aparición de aumento de la presión intraocular o infecciones por hongos, por esto no debe utilizar este medicamento por más tiempo que el indicado por su médico.

3. - Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** a través del ojo, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

No se ha reportado que este medicamento cause problemas durante el periodo de lactancia, sin embargo debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar, nuevamente, con su médico.

Este medicamento es de uso personal, ya que si lo comparte con otra persona se puede producir un contagio de la infección.

4. - Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a dexametasona, tobramicina u otra solución o ungüento oftálmico.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si presenta una infección viral o micótica en el ojo o sus anexos.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre los ojos el riesgo de interacciones es bajo.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **herpes simple**, **varicela**, alguna infección por hongos en los ojos, **tuberculosis**, **cataratas**, **diabetes mellitus**, **glaucoma**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: visión borrosa, dolor de los ojos, náuseas, vómitos, picazón, irritación, inflamación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, aumento e la secreción de lágrimas.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: aumento en la secreción de lágrimas, picazón, enrojecimiento, inflamación del ojo o los párpados, dolor de los ojos, visión borrosa.

Debe acudir al médico para que lo evalúe

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C, no refrigerar, no congelar

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.