

DICLOFENACO DIETILAMINA SOLUCION TOPICA SPRAY 1,16%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

1.- Composición:

Cada 100 mL contienen:

Diclofenaco Dietilamina 1,16 g

Excipientes: Según lo aprobado en Registro

2.-Vía de administración:

La vía de administración es tópica.

3.-Clasificación Terapéutica:

Antiinflamatorio – Analgésico

4.- Indicaciones:

Diclofenaco Dietilamina Spray esta indicado para el alivio sintomático local del dolor y la inflamación.

5.- Precauciones y Advertencias:

Embarazo: Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que se debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

Lactancia: Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que se debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

Lactantes y niños: se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, ya que no se han establecido las dosis ni las indicaciones recomendadas para niños menores de 12 años.

Se debe utilizar sólo sobre la piel sana, sin heridas ni lesiones abiertas. Se debe evitar la aplicación en los ojos o mucosas, si esto ocurre lave con abundante agua.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

5.-Interacciones

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si esta utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Contraindicaciones :

Cuando existen heridas o irritación en la zona afectada.

No se debe utilizar si usted es alérgica al medicamento o a otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico.

Si ha presentado alergia a algún componente de la formulación.

7.- Efectos adversos:

En ocasiones pueden aparecer algunas reacciones locales como dermatitis de contacto, con síntomas como escozor, prurito y enrojecimiento de la piel, si estos efectos persisten o se intensifican discontinuar el uso del medicamento y consultar al médico.

8.- Modo de empleo y Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Para adultos y niños mayores de 12 años : Antes de usar agite el envase y aplique una cantidad suficiente de Diclofenado Dietilamina Spray en la parte afectada, dando un leve masaje hasta que se absorba totalmente. Después de masajear la solución sobre su piel, lave sus manos, salvo que ellas sean el sitio a tratar. En caso necesario repetir la aplicación 3 a 4 veces al día. No exceda la dosis recomendada. Siga correctamente el modo de empleo. Si los síntomas persisten después de 2 semanas, consulte a su médico.

Ancianos: Puede utilizarse la misma dosis que para los adultos.

9.-Sobredosis:

Si se producen efectos secundarios sistémicos a consecuencia de empleo inadecuado de este producto o de una sobredosificación accidental, se debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

10.-Condiciones de almacenamiento

Según lo aprobado en Registro.

11.-Presentación:

Según lo aprobado en Registro.

Revisado el 2 de enero del 2007