

Diclofenaco Gel Tópico

Diclofenaco sódico

Gel 1%

Lea detenidamente este inserto antes de utilizar este medicamento. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

1. ¿Qué contiene Diclofenaco Gel Tópico ?

Cada 100 gramos de Diclofenaco Gel Tópico contienen 1 g (1%) de diclofenaco sódico.

Excipientes: enumerar cualitativamente según última fórmula autorizada

PROPIEDADES / INDICACIONES

¿Cómo actúa Diclofenaco Gel Tópico ?

Este medicamento está indicado en el alivio sintomático local del dolor e inflamación.

Diclofenaco Gel Tópico pertenece a una clase terapéutica que se denomina "antiinflamatorios no esteroideos" (AINEs), que son utilizados para aliviar el dolor y reducir la inflamación y edema en varias condiciones dolorosas que afectan las articulaciones y músculos. Diclofenaco Gel Tópico está formulado especialmente para ser aplicado y frotado en la piel.

3. ¿Para qué sirve Diclofenaco Gel Tópico ?

Se usa en:

Tendinitis de miembros superiores e inferiores

Edemas post operatorio y postraumático

Diclofenaco Gel Tópico también puede ser utilizado para el tratamiento de otras afecciones según sea determinado por el médico.

DOSIS / MODO DE EMPLEO

4. ¿Cómo debe ser usado Diclofenaco Gel Tópico ?

Adultos y niños mayores de 12 años de edad: Según la extensión del área afectada, aplique frotando suavemente 2 a 4 g (equivalentes al tamaño de una cereza al de una nuez, cantidad suficiente para el tratamiento de un área de 400 a 800 cm²), tres o cuatro veces al día. Cuando el gel es frotado en la piel, se puede percibir un ligero efecto refrescante.

Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis indicada, ni utilice por más de dos semanas en casos de golpes en músculos o articulaciones y tendinitis; por más de tres semanas en caso de dolor artrítico, a menos que sea indicado por el médico.

Si los síntomas persisten o empeoran, después de 7 días, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

5. ¿Cuándo no debe usarse Diclofenaco Gel Tópico ?

Si es alérgico o hipersensible a cualquiera de los componentes enumerados en la sección "¿Qué contiene Diclofenaco Gel Tópico ?".

Si ha tenido alguna vez una reacción alérgica o ataque asmático después de utilizar diclofenaco o cualquier otro antiinflamatorio/analgésico como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

6. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Diclofenaco Gel Tópico ?

Aplicar Diclofenaco Gel Tópico solamente sobre la piel intacta; evite la aplicación sobre la piel irritada o heridas abiertas, membranas mucosas o área genital. Así mismo, evite la aplicación en los ojos o cerca de los mismos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y consultar con el médico.

Diclofenaco Gel Tópico no debe ser ingerido.

La formulación contiene propilenglicol, el cual puede causar irritación en la piel de ciertas personas.

EMBARAZO / LACTANCIA

7. ¿Puede ser utilizado Diclofenaco Gel Tópico durante el embarazo o el período de lactancia?

No utilice Diclofenaco Gel Tópico si está embarazada o en período de lactancia.

Consulte a su profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento.

USO PEDIÁTRICO / NIÑOS

8. ¿Puede ser usado Diclofenaco Gel Tópico en los niños?

Diclofenaco Gel Tópico no debe ser utilizado en niños menores de 12 años de edad.

PERSONAS DE EDAD AVANZADA

9. ¿Puede ser usado Diclofenaco Gel Tópico en las personas de edad avanzada?

Diclofenaco Gel Tópico puede ser utilizado en personas de edad avanzada. Sin embargo es necesario tener en cuenta que al igual que ocurre con otros antiinflamatorios, las personas de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos de Diclofenaco Gel Tópico que otros adultos.

REACCIONES SECUNDARIAS

10. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Diclofenaco Gel Tópico ?

Al igual que todos los medicamentos Diclofenaco Gel Tópico a veces puede producir reacciones secundarias en algunas personas.

Algunas reacciones secundarias raras y muy raras pueden ser serias. Si usted tiene alguno de los siguientes signos de alergia, DETENGA el uso de Diclofenaco Gel Tópico y contacte inmediatamente a un médico:

Urticaria o salpullido en la piel con ampollas. Esto podría suceder y afectar de 1 a 10 personas en 10,000.

Dificultad respiratoria o agotamiento de la respiración, asma. Esto podría suceder y afectar a menos de 1 persona en 10,000.

Hinchazón de la cara, labios, lengua o cuello. Esto podría suceder y afectar a menos de 1 persona en 10,000.

Reacciones secundarias menos serias. Otras reacciones secundarias que pueden ocurrir son usualmente leves, pasajeras e inofensivas. Si usted es afectado, llame lo más pronto posible a un profesional de la salud.

Rash en la piel, picazón o comezón, enrojecimiento o resentimiento de la piel son comunes después del uso. Esto podría suceder y afectar de 1 a 10 personas en 10,000.

Muy raramente, la piel puede volverse más sensible a la luz del sol. Los signos posibles son quemaduras de sol con picazón o comezón, inflamación y ampollas. Esto podría suceder y afectar a menos de 1 persona en 10,000.

Si cualquiera de estas reacciones secundarias se torna más seria o si nota cualquier otra reacción secundaria que no este enumerada en este inserto, por favor indíquelo a su profesional de la salud.

INTERACCIONES

11. ¿Está tomando otros medicamentos?

Hasta la fecha no se ha reportado que Diclofenaco Gel Tópico interfiera con otros medicamentos. Sin embargo, si está tomando otros medicamentos (tanto de prescripción médica como sin prescripción médica) debe consultar con su profesional de la salud antes de utilizar Diclofenaco Gel Tópico .

COMENTARIOS ESPECIALES

12. ¿Cómo se debe almacenar Diclofenaco Gel Tópico ?

Conservar a la temperatura señalada en el envase

No utilice el producto después de la fecha de expira que se indica en el empaque.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.