

Nombre: Difenidol Condición de venta: con receta médica Clasificación: antivertiginoso Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en la prevención y tratamiento sintomático del vértigo periférico y asociado a náuseas y vómitos en condiciones tales como la enfermedad de meniere y cirugía del oído medio a interno. También es usado en la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos asociados con estados postoperatorios, neoplasias malignas, laberintitis, etc.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 25 mg. cada 4 horas, aunque en algunos casos sea necesario una dosis a 50 mg. cada 4 horas.

- Uso prolongado

Si sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Consumo de alcohol

Debe evitar tomar alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos tales como somnolencia, fatiga.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y /o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**. Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño. Debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a difenidol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica. En este caso en particular se han descrito interacciones con los medicamentos siguientes: metoclopramida, fenobarbital, amitriptilina, clomipramina, desipramina, isocarboxazida, **benzodiazepinas**, carbamazepina, fenitoina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **glaucoma**, bloqueo intestinal, **úlceras estomacal**, **hipotensión**.

- **Alimentos**

El consumir alimentos que contengan alcohol puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: confusión, **alucinaciones**.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, visión borrosa, mareos, sequedad de boca, dolor de cabeza, nerviosismo, dificultad para dormir, dolor estomacal, mareos.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia severa, dificultad para respirar, mareos severos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.