

<b>Nombre:</b> Digoxina <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> digitálico cardiaco <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de **insuficiencia cardiaca congestiva** y para el control del ritmo cardiaco en pacientes que presentan ciertas anormalidades del ritmo cardiaco (taquiarritmias supraventriculares).

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento, este medicamento requiere que la dosis sea adecuada según el requerimiento, estado general, estado cardiovascular, función renal y concentración plasmática de la droga. Las dosis de digoxina generalmente oscilan en el rango de 0.0625 a 0.5 mg. diarios tomados en una sola toma al día, la dosis óptima para usted la indicará su médico.

#### Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento con el estómago vacío y siempre a la misma hora del día. Si produce demasiado malestar estomacal puede ser tomado con leche o con las comidas.

#### - Uso prolongado

Siga las instrucciones de su médico, no tome más o menos de lo señalado. Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Este medicamento controla su enfermedad, pero no la cura, por lo que usted debe continuar tomándola en la cantidad y frecuencia señalada por su médico, aunque se sienta bien. No interrumpa el tratamiento sin consultar con su médico, debe visitarlo periódicamente, mientras esté en tratamiento

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, pueden presentar síntomas de sobredosis, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con digoxina. Los pacientes que cursan con deterioro de su función renal requieren ajuste de dosis, lo cual será indicado por su médico.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, visión borrosa y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede dañar al **feto**, asegúrese de avisar a su médico que está embarazada o planifica estarlo

- **Lactancia**

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Las bebidas alcohólicas pueden aumentar el efecto de somnolencia del medicamento

No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico.

Si usted va a someterse a cualquier cirugía, incluyendo la dental, no olvide decirle a su doctor o dentista que está tomando digoxina

Usted debe concurrir a todos los controles médicos, puede necesitar un ajuste de dosis, es probable que su médico le indique exámenes de sangre periódicos y electrocardiogramas

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a digoxina o digitoxina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: amiodarona, anfetaminas, digitoxina, salbutamol, diltiazem, felodipino, nifedipino, nimodipino, verapamilo, propafenona, colestiramina, colestipol, sucralfato, atapulguita, loperamida, furosemida, hidroclorotiazida, insulina, vitamina B 12, vitamina D, ácido acetilsalicílico (aspirina), fenolftaleína, quinidina, diuréticos, corticoesteroides, medicamentos para la tiroides, antiácidos, antibióticos

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna enfermedad a los pulmones, problemas a la **tiroides, arritmias**.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, palpitaciones, dificultad para respirar, alucinaciones, confusión, somnolencia severa, visión borrosa, fatiga, náuseas, agitación.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mareos, cambios de visión, latido del corazón irregular

**7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: pérdida del apetito, náuseas o vómitos, dolor de estómago, diarrea, mareos, latidos irregulares del corazón, visión borrosa, somnolencia, confusión, depresión, dolor de cabeza, desmayos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.