

Nombre: Enalapril Condición de venta: con receta médica Clasificación: hipotensor Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Es un **inhibidor** de la **enzima convertidora de angiotensina** que se utiliza para el control de la **hipertensión arterial** y para la prevención de la **insuficiencia cardíaca** en conjunto con otros tratamientos.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: al inicio del tratamiento 2,5 a 5 mg. una vez al día, según prescripción médica, la dosis usual está en el rango de 10-40 mg. una vez al día o repartida en dos dosis diarias.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca la dosis inicial es 2,5 mg. dos veces al día, la dosis usual oscila en el rango de los 2.5-20 mg. dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 40 mg. en ambos casos.

- Consejo de cómo administrarlo

Su médico le indicará la dosis y frecuencia con que este medicamento debe ser consumido según la patología que usted presente. No tome más medicamento ni con más frecuencia que el que su médico le indica

Este medicamento lo puede consumir con o sin comida.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómelo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para tomar el medicamento

- Uso prolongado

Debe mantener un constante control médico, además de una revisión regular de la **presión arterial**.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con enalapril. Los pacientes que cursen con daño renal deben consultar por el uso de este medicamento con su médico tratante.

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con enalapril, ya que, puede provocar un incremento en el efecto de la droga, o causar mareos y debilidad.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, su uso durante el embarazo está contraindicado. Si usted está embarazada debe advertírselo a su médico.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

- Lactantes y niños

No se recomienda su utilización en niños, a menos que su pediatra así lo señale..

- Precauciones especiales

Para evitar el riesgo de una caída brusca de su **presión arterial**, se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja; según indique su médico, y tomarlo de preferencia en la noche, sobre todo en pacientes ancianos.

Aunque la presión arterial esté controlada y se sienta bien no debe dejar de tomar el medicamento sin consultar a su médico.

Usted debe visitar periódicamente a su médico, para evaluar su presión y tratamiento

No interrumpa el tratamiento sin consultar a su médico.

Antes de hacerse algún tipo de cirugía, ya sea dental o de otro tipo debe decirle al médico a cargo o dentista que está en tratamiento con este medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al enalapril, benazepril, cilazapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: suplementos de potasio, warfarina, medicamentos para el resfrío, alopurinol, glibenclamida, ácido acetilsalicílico y otros **analgésicos** y **antiinflamatorios**, clozapina, ciclosporina, furosemida, hidroclorotiazida, probenecid, rifampicina y sales de litio.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades **autoinmunes** como **lupus eritematoso sistémico**, **diabetes mellitus**, **estenosis arterial renal**.

- Alimentos

Debe evitar consumir alimentos que contengan mucho potasio.

- **Exámenes de laboratorio**

Antes de practicarse algún examen de sangre y / o de orina debe avisar al médico a cargo que está en tratamiento con este medicamento

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

fiebre y escalofríos, dolor de garganta y ronquera, súbita dificultad para respirar, inflamación de la cara, boca o extremidades, fiebre, escalofríos, confusión, coloración amarillenta de piel u ojos, picazón intensa, dolor en el pecho o palpitaciones, dolor abdominal.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: tos seca y persistente, mareos y dolores de cabeza, alteración en el gusto.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, frío, calambres. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.