

Nombre: Fenolftaleína Condición de venta: con receta médica Clasificación: laxante Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

La fenolftaleína es un **laxante** que aumenta la **motilidad** y se utiliza para tratar el **estreñimiento** a corto plazo.

2.- Administración

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 60-120 mg. al día..

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento antes de ir a dormir.

Para evitar el **estreñimiento** debe llevar una dieta adecuada, beber mucho líquido y hacer ejercicio.

- Uso prolongado

El uso prolongado o frecuente de este u otro laxante puede crear hábito.

El uso prolongado puede provocar el efecto contrario al deseado (**estreñimiento**), por lo que si los síntomas persisten o empeoran debe consultar nuevamente a su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

La fenolftaleína puede provocar efectos adversos más severos en ancianos, como debilidad y pérdida importante de agua y potasio.

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que este puede aumentar los efectos adversos de fenolftaleína.

- Embarazo

Puede utilizarlo durante el embarazo siempre que no lo haga en forma continua ni prolongada, y bajo la indicación de su médico.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que no debe usar este medicamento si está en período de lactancia o si lo hace consúltele con su médico si debe suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños

En niños menores de 6 años debe estar indicado por su pediatra.

No debe utilizarse en niños menores de 2 años.

- **Precauciones especiales**

Si los síntomas persisten o empeoran consulte a su médico.

Durante el tratamiento puede observar que su orina o heces se vuelvan un poco rojizas, esto es normal. Una vez terminado el tratamiento deben volver a tener color normal, de lo contrario debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a fenolftaleína.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si usted presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, digoxina, ciprofloxacino, etidronato, poliestireno sulfonato de sodio, tetraciclina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de algún síntoma de **apendicitis**, **hemorragia** rectal de causa desconocida, **colostomía**, bloqueo intestinal, **ileostomía**, **diabetes mellitus**.

- **Exámenes de laboratorio**

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: confusión, ritmo irregular del corazón, calambres musculares

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: calambres, diarrea, náuseas.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres estomacales, náuseas, vómitos, diarrea. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.