

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre: Flucloxacilina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiótico Disponible en: | Nombres de marca: |
|---|--------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento de infecciones sistémicas o localizadas, causadas por estafilococos penicilino-resistentes, como faringitis bacteriana, sinusitis e infecciones de piel y tejidos blandos.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 500 mg. cada 6 horas.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento 1 a 2 horas antes de las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con flucloxacilina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de flucloxacilina.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada, aunque su uso se considera seguro en el embarazo.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Debe tomar el medicamento todo el tiempo que su médico le indique, aunque sienta que los síntomas hayan desaparecido.

Si se encuentra tomando **anticonceptivos** orales con estrógenos el uso de flucloxacilina puede disminuir el efecto del anticonceptivo, por lo que se recomienda utilizar otro método **anticonceptivo** (no hormonal), durante el tratamiento con flucloxacilina.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a flucloxacilina u otros antibióticos.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alopurinol, aminoglucósidos, **anticonceptivos** orales, cloranfenicol, fenitoina, probenecid, tetraciclinas, gentamicina, neomicina, amikacina, paracetamol, ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros antiinflamatorios, amiodarona, carbamazepina, fluconazol, isoniazida, ketoconazol, metildopa, pemolina, rifampicina, sulfametoxazol.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades **gastrointestinales**, **colitis ulcerosa**.

- **Exámenes de laboratorio**

Flucloxacilina puede alterar los resultados de análisis de glucosa en orina en pacientes diabéticos, por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor de cabeza, **candidiasis** bucal (manchas de color blanco en la boca o lengua) o **candidiasis** vaginal (picañón o ardor en la vagina).

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **rash**, **prurito**, **urticaria**, náuseas, vómitos, sensación de pesadez en el estómago.

7. - Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.