

Nombre: Fenoximetilpenicilina (Penicilina V) Condición de venta: con receta médica Clasificación: Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es un tipo de antibiótico usado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio y piel, entre otras, especialmente aquellas producidas por estafilococos y estreptococos sensibles a la acción de penicilinas.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- ❖ Adultos y niños desde 12 años: 125-500mg. (200.000-800.000 U.I.) a intervalos de 6 a 8 horas.
- ❖ Niños hasta 12 años: 2.5-8.3 mg. (4.167-13.280U.I.) / Kg. cada 4 horas, de 3.75-12.5 mg. (6.250-20.000U.I.) / Kg. cada 6 horas ó de 5.0-16.7 mg. (8.333-26.720U.I.)/Kg. cada 8 horas.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda ingerir este medicamento con el estómago vacío 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante produciéndole **hipersensibilidad**, diarrea y **candidiasis**. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. Administrado en las dosis habituales, no se espera que se produzcan reacciones serias.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Tome el medicamento por todo el período que su médico le indicó, aunque sienta que los síntomas han desaparecido.

Si presenta diarrea intensa mientras está en tratamiento con este medicamento, consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento para su malestar.

Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto durante el tratamiento con fenoximetilpenicilina, por lo que debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar el embarazo.

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a fenoximetilpenicilina u otras penicilinas.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: neomicina, probenecid, anticonceptivos orales, cloramfenicol, eritromicina, sulfonamidas, tetraciclina, colestiramina, colestipol, metotrexato.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de alergias, **asma**, desordenes de **coagulación**, insuficiencia cardíaca congestiva, **fibrosis quística**, desordenes **gastrointestinales**, **mononucleosis**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: respiración irregular, rápida o dificultosa, desmayos súbitos, dolores **articulares**, fiebre, dolor abdominal severo y calambres

estomacales, con **heces** blandas y con sangre, reacción alérgica severa (marcada por súbita **inflamación** de los labios, lengua, cara o garganta, dificultad para respirar, **rash**, picazón), inusuales **hemorragias** o moretones, piel u ojos amarillos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea leve, náuseas leves, dolor de cabeza, picazón vaginal, dolor o manchas blancas en la boca o en la lengua.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas severas, vómitos, diarreas.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.