

Nombre: Glibenclamida Condición de venta: con receta médica Clasificación: antidiabético Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el manejo de la glicemia en pacientes con diabetes tipo 2 cuando las medidas no farmacológicas como dieta y ejercicio son insuficientes.

2.- Administración

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es al inicio de la terapia 2.5 a 5 mg. Al día junto con el desayuno o la primera comida del día, se recomienda entonces aumentar la dosis en intervalos de 2.5 mg. A intervalos semanales dependiendo de la respuesta del paciente, la dosis máxima recomendada es de 20 mg. Al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que ingiera el medicamento en una sola toma, antes del desayuno, si la dosis diaria es superior a los 10 mg es preferible que los reparta en dos tomas una antes del desayuno y otra antes de la cena, según las indicaciones de su médico.

No tome más ni menos medicamento que el indicado por su médico

- Uso prolongado

Tal vez usted tenga que tomar toda su vida este medicamento, si es su caso debe visitar a su médico en forma periódica y controlarse los niveles de azúcar en la sangre y orina. Estos exámenes son importantes para que el médico ajuste la dosis que a usted le corresponde. Use este medicamento solo en la frecuencia y cantidad señalada por su médicos.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Estos pacientes son mas sensibles a los efectos adversos del medicamento, su médico debe ir evaluando cuidadosamente la dosis a administrar.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol, ya que puede producirse una baja severa de los niveles de azúcar en la sangre.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que

ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo, se prefiere la insulina. En caso de que el médico estime necesaria la administración de este medicamento, a pesar de su embarazo, usted debe suspender la toma de este medicamento a lo menos una semana antes del parto.

En el caso de sufrir diabetes producida por el embarazo, no debe tomar medicamentos, ya que se controla sólo con una dieta adecuada.

- Lactancia

Debido al riesgo de producir disminución del azúcar en el lactante, se recomienda suspender la lactancia materna durante el tratamiento.

- Lactantes y niños

No debe utilizar este medicamento para tratar **diabetes juvenil**.

- Precauciones especiales

Debe controlarse periódicamente los niveles de glucosa en sangre y en orina mientras se esté en tratamiento con glibenclamida.

Es conveniente llevar siempre una identificación o un carnet en el que se indique que es diabético y los medicamentos que toma.

Mientras esté usando este medicamento, usted puede presentar un bajón en el nivel de azúcar en su sangre. Usted puede sentir debilidad, sueño, confusión, ansiedad o mucha hambre. Usted puede tener dificultad para ver o puede presentar un dolor de cabeza que no desaparece. Pregúntele a su médico lo que usted debe hacer si estas cosas se presentan. Algunos factores que pueden conducir a un bajón en el nivel de azúcar en su sangre son ejercitarse más de lo normal o esperar demasiado para comer.

Este medicamento puede hacer que su piel sea más sensible a la luz solar. Use un protector solar cuando esté al aire libre. Evite las lámparas y cámaras bronceadoras.

Este medicamento sólo hace parte de un programa completo para controlar la diabetes. Usted puede ayudarse a sí mismo siguiendo una dieta saludable, vigilando su peso y ejercitándose con regularidad.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a glibenclamida o a otras sulfonilureas, sulfonamidas o tiazidas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si padece de **diabetes mellitus juvenil** (insulino dependiente o tipo I) o en diabetes complicadas con **acidosis**.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros **antiinflamatorios**, captopril, enalapril, moclobemida, tranilcipromina, ciprofloxacino, clobibrato, furosemida, prednisona, rifampicina, **anticonceptivos** orales, anticoagulantes y algunos antidepresivos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **porfiria**, **enfermedad de Addison** (insuficiencia suprarrenal), fiebre elevada, malnutrición, vómitos o **insuficiencia hipofisiaria**.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reducción severa de los niveles de azúcar en la sangre, ansiedad, visión borrosa, sudor frío, mareo, dificultad en concentrarse), convulsiones.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, mareos, **estreñimiento**, diarrea, alteraciones del gusto.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: ansiedad, escalofríos, sudores fríos, confusión, piel pálida y fría, dificultad para concentrarse, somnolencia, hambre excesiva, latidos cardiacos rápidos, dolor de cabeza, náuseas, nerviosismo, agitación, marcha inestable, cansancio o debilidad no habituales. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.