

<b>Nombre:</b> Glucosamina <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antiartrósico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado como suplemento de carencia endógena de glucosamina en artrosis primaria de diferente localización y artrosis generalizada.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 500 mg. de glucosamina tres veces al día por un período mínimo de 4 semanas.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con un vaso de agua.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

#### - Embarazo

No se debe utilizar este medicamento durante el embarazo a menos que su médico lo considere estrictamente necesario.

#### - Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Si después de unas semanas, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debido a que el efecto de este medicamento se comienza a percibir luego de una semana de tratamiento, se pueden utilizar analgésicos para disminuir el dolor en conjunto con glucosamina.

#### **4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a glucosamina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5. - Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: tetraciclina, penicilina, cloramfenicol.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **fenilcetonuria**.

#### **6. - Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: náuseas, vómitos, **dispepsia**, dolor de estómago, sensación de quemadura, dolor abdominal, **anorexia**, reacciones a la piel, dolor de cabeza, insomnio.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mal aliento, constipación, **meteorismo**, somnolencia.

#### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de estómago.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.

