

Nombre: Griseofulvina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antimicótico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel, cabello y uñas tales como tinea barbae, tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis y tinea unguim (onicomicosis) provocadas por trichophyton rubrum, t. tonsurans t. mentogrophytes, t. interdigitales, t. verrucosum, t. megninii, t. gallinae, t. schoenleinii, microspurum audouinii, m. canis, m. gypseum y epidermophyton floccosum.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 12 años:
 - Onicomicosis o tinea pedis: 500 mg. cada 12 horas por 4 a 8 semanas.
 - Tiña capitis y corporis : 500 mg. una vez al día o 250 mg. cada 12 horas. La duración del tratamiento es de 8 a 10 semanas para la tiña capitis y 2 a 4 semanas para la tiña corporis.
- La dosis pediátrica para niños mayores de 2 años es de: 5 mg./Kg. de peso cada 12 horas o de 10 mg./Kg. De peso una vez al día.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto o inmediatamente después de las comidas o con un vaso de leche para evitar molestias gastrointestinales y aumentar la absorción.

- Uso prolongado

Debe usarlo solamente el tiempo que su médico lo señale, respetando los horarios y las dosis, ya que el uso prolongado de este medicamento puede causar efectos adversos severos.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con griseofulvina.

- **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de griseofulvina.

- **Manejo de vehículos**

Esta medicina puede causar sueño. Tenga cuidado si maneja un automóvil o usa maquinaria.

- **Embarazo**

No se recomienda utilizar este medicamento durante el embarazo. Usted debe asegurarse que su médico sabe que se encuentra embarazada, antes de tomar este medicamento.

- **Lactancia**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño. Debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se recomienda utilizar en niños menores de 2 años.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede causar una mayor sensibilidad de su piel al sol, presentándose síntomas como picazón **rash**, decoloración de la piel, o quemaduras severas en la piel por el sol. Por lo que se recomienda no tomar sol en forma directa especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y utilizar un factor solar 15.

Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto durante el tratamiento con griseofulvina, por lo que debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar el embarazo.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a griseofulvina o penicilinas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol, anticonceptivos orales.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **lupus eritematoso sistémico, porfiria**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: confusión, rash, picazón, irritación de la boca o la lengua, dolor o debilidad de los pies o manos, dolor de garganta y fiebre, ojos y piel amarillos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, diarrea, mareos, dolor de estomago, dificultad para dormir.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.