

Nombre: Bromuro de ipratropio -
Salbutamol inhalatorio

Condición de venta: con receta
médica

Clasificación: broncodilatador

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- Composición y presentación:
- Principio Activo:
- Excipientes:

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se usa para el tratamiento del bronco espasmo asociado a enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada o grave, en pacientes que requieren mas de un único broncodilatador.

2.- Administración (inhalatoria)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 2 inhalaciones (0.018 mg.de bromuro de ipratropio/0.103 mg. de salbutamol)

4 veces al día, en caso que sea necesario se pueden administrar hasta 12 inhalaciones al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes de aplicarse el medicamento debe botar el aire de los pulmones para luego tomar aire en conjunto con la aplicación del puff, para así asegurarse que todo el medicamento esta siendo aspirado. “Siga exactamente las instrucciones de su médico, él le indicará la correcta forma de administración”, se puede insertar diagrama explicativo

- Uso prolongado

Si lo utiliza por mucho tiempo, puede provocar una disminución en la efectividad del medicamento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Se recomienda utilizar dosis más bajas

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Debe consultar con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento durante el embarazo.

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

No debe utilizar salbutamol - bromuro de ipratropio en niños menores de 12 años, a menos que su pediatra lo indique

- Precauciones especiales

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo un control de dopaje.

Si padece de diabetes debe tener en cuenta que salbutamol puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre.

. Debe ser usado con precaución en pacientes con predisposición a hiperplasia prostática, obstrucción de cuello de vejiga y glaucoma de ángulo estrecho.

Dígale a su médico todos los medicamentos que actualmente está consumiendo.

Es muy importante que usted visite regularmente a su médico mientras se encuentre en tratamiento con salbutamol - bromuro de ipratropio.

Si los síntomas empeoran o continúan después de 30 minutos de haberse administrado este medicamento debe acudir nuevamente al médico.

Debe evitar aplicar sobre los ojos, ya que puede causar irritación.

Pacientes con fibrosis quística pueden ser más susceptibles a presentar alteraciones motoras del tracto gastrointestinal. Se debe administrar con precaución en pacientes con cardiopatía severa, hipertiroidismo, feocromocitoma y pacientes deshidratados.

Complicaciones oculares:

Al entrar en contacto con los ojos pueden producirse complicaciones oculares (midriasis, aumento de la presión intraocular, glaucoma de ángulo estrecho y dolor). De presentar alguno de los siguientes síntomas debe consultar a un especialista: dolor ocular, visión borrosa, halos visuales o imágenes coloridas asociados a enrojecimiento del ojo

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a salbutamol y /o bromuro de ipratropio.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si usted es alérgico(a) a la soya y sus derivados o al maní.

Si es alérgico a atropina.

Esta contraindicado en pacientes con cardiopatía obstructiva hipertrófica, taquiarritmia

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: propanolol, atenolol, algunos diuréticos como furosemida, metildopa, teofilina, anfetaminas, inhibidores del apetito, medicamentos para los resfríos, para las alergias, antidepresivos tricíclicos, IMAO (tratamiento para el Parkinson), anestésicos hidrocarburos halogenados inhalados, glucocorticoides.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, hipertiroidismo, insuficiencia coronaria, hipertensión, glaucoma, dificultad para respirar.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: inflamación de la cara, labios o alrededor de los

ojos, mareos severos, palidez, dificultad para respirar, latidos irregulares del corazón, taquicardia, convulsiones, calambres, urticaria, colapso, náusea y vómitos, constipación, dolor abdominal, dolor de ojos severo, rash.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: intranquilidad, mareos, problemas para dormir, palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, dolor de cabeza, temblor muscular, calambres musculares, debilidad, tos, sequedad de boca, sabor desagradable en la boca, dolor de cabeza leve. Muy rara vez se pueden presentar alteraciones psicológicas.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: hipotensión o hipertensión, arritmias, palpitaciones, nerviosismo, fatiga, malestar, insomnio, dolor de cabeza, sequedad de boca, náuseas, dolor en el pecho, taquicardia. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.