

**Nombre:** Bromuro de ipratropio  
inhalatorio

**Condición de venta:** con receta  
médica

**Clasificación:** broncodilatador

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en:

- Tratamiento bronquitis.
- Tratamiento enfisema pulmonar.
- Tratamiento enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

### 2.- Administración (inhalatoria)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos 1 a 2 inhalaciones( 18 a 40 microgramos),4 veces al día, dejando transcurrir por lo menos 4 horas entre una y otra inhalación. No debería excederse una dosis diaria total de 12 puff.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes de aplicarse el medicamento debe botar el aire de los pulmones para luego tomar aire en conjunto con la aplicación del puff, para así asegurarse que todo el medicamento esta siendo aspirado.. "siga exactamente las instrucciones de su médico, él le indicará la correcta forma de administración" (se puede insertar un diagrama explicativo)

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

### 3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

No se han reportado problemas para la utilización de bromuro de ipratropio por vía inhalatoria durante el embarazo, sin embargo debe consultar con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento durante el embarazo.

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el periodo de lactancia cause efectos sobre el lactante, no obstante debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Debe ser usado con precaución en pacientes con predisposición a hiperplasia prostática, obstrucción de cuello de vejiga y glaucoma de ángulo estrecho.

Este medicamento no es útil en un ataque agudo de asma que ya ha empezado, su médico le recetará otros medicamentos si usted presenta una crisis de este tipo.

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo un control de dopaje.

Es muy importante que usted visite regularmente a su médico mientras se encuentre en tratamiento con bromuro de ipratropio.

Si considera que los medicamentos que usted toma no le están haciendo efecto llame a su médico, no aumente la dosis de medicamento ni suspenda su uso sin consultar previamente a su médico tratante.

Debe evitar aplicar sobre los ojos, ya que puede causar irritación.

Pacientes con fibrosis quística pueden ser más susceptibles a presentar alteraciones motoras del tracto gastrointestinal. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad tras la administración de bromuro de ipratropio evidenciado por raros casos de urticaria, angioedema, rash, broncoespasmo, edema orofaríngeo y anafilaxis.

Complicaciones oculares:

Al entrar en contacto con los ojos pueden producirse complicaciones oculares (midriasis, aumento de la presión intraocular, glaucoma de ángulo estrecho y dolor). De presentar alguno de los siguientes síntomas debe consultar a un especialista: dolor ocular, visión borrosa, halos visuales o imágenes coloridas asociados a enrojecimiento del ojo.

#### **4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a bromuro de ipratropio.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si es alérgica al maní o a la soya y sus derivados.

Si es alérgico a atropina.

#### **5.- Interacciones**

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

Otros broncodilatadores pueden potenciar el efecto del bromuro de ipratropio.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de glaucoma, dificultad para orinar.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: constipación, dolor abdominal, dificultad para respirar, dolor de ojos severo, rash, inflamación de la cara, párpados y labios.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: tos, sequedad de boca, sabor desagradable en la boca, dolor de cabeza

leve, palpitaciones, taquicardia.

#### **7.- Sobredosis**

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

Pueden ocurrir síntomas generales como sequedad bucal, alteración en la acomodación visual y aumento en la frecuencia cardíaca.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura indicada en el estuche

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.