

Nombre: Levonorgestrel

(0,75mg)

Condición de venta: con receta
médica

Clasificación: anticonceptivo
hormonal de emergencia.

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

▪ **Composición y presentación:**

▪ **Principio Activo:**

▪ **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Anticonceptivo de emergencia, indicado dentro de un período de 72 horas después de una relación sexual donde el método anticonceptivo tradicional ha fallado:

- Ruptura o mal uso del preservativo.
- Mal uso del anticonceptivo oral, u olvido de tomarlo en un período mayor al permitido.
- Expulsión de un dispositivo intrauterino,
- Desplazamiento del diafragma vaginal.

También es usado especialmente en casos de violación

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es 1 comprimido de 0.75 mg. Hasta 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales y otro comprimido , 12 horas después de haber tomado el primero.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento lo antes posible y no después de 72 horas de haber transcurrido la relación sexual.

Uso prolongado

No debe utilizar este método anticonceptivo en forma habitual, ya que si lo utiliza más de una vez al mes, pueden presentarse sangramientos irregulares, anormalidades del ciclo y aumento de la probabilidad de embarazo. Este método es menos efectivo que los anticonceptivos orales habituales.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Este medicamento esta dirigido a mujeres en edad fértil.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de

alerta.

- Embarazo

No debe tomarlo durante el embarazo.

- Lactancia

Debe consultar con su médico sobre la seguridad de utilizar este medicamento si se encuentra amamantando.

- Precauciones especiales

Este medicamento no interrumpe un embarazo en curso.

Este medicamento no protege del contagio por virus VIH (SIDA) o alguna enfermedad de transmisión sexual.

En el caso que se produzca embarazo pese al uso del medicamento, debe prestar especial atención si presenta dolores en el abdomen bajo, debe acudir donde su médico para descartar un posible embarazo tubario (extrauterino.)

Este medicamento es para ser usado en casos ocasionales, **no sirve como anticonceptivo habitual**

Después de usar este anticonceptivo de emergencia, el siguiente ciclo mensual puede empezar antes o después de la fecha habitual y el flujo puede ser mas o menos intenso. La mayoría de las mujeres inicia el ciclo 7 días después de lo acostumbrado. Si existe un atraso de tres semanas, debe sospechar un embarazo

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al levonorgestrel u otra hormona.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si se encuentra embarazada.

Si presenta sangrado vaginal anormal no diagnosticado.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: aminoglutenimida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus** graves, antecedentes de colesterol alto, procesos **trombóticos** o **tromboembólicos**, arteriales o venosos, cáncer de mamas o **endometrio**, trastornos **cardiovasculares** o **cerebrovasculares**, **hiperplasia endometrial**, depresión, **epilepsia**, dolores de cabeza, **osteoporosis**, **asma**.

- Exámenes de laboratorio

Puede interferir con ciertas pruebas de laboratorio por lo que debe informar la utilización de este medicamento antes de realizarse los exámenes.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: cambios en la hemorragia menstrual, depresión, rash, aparición inexplicable de flujo de leche, dolor abdominal, dolor de cabeza leve, cambios en el carácter, nerviosismo, ganancia de peso, acné, pérdida del apetito sexual, tensión mamaria, fiebre, edema, retención de líquido, urticaria, depresión.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, vértigo, alteraciones menstruales, tensión mamaria.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.