

Nombre: Lidocaína -Sulfatiazol Condición de venta: con receta médica de uso ótico Clasificación: antiséptico ótico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento de la otitis aguda y crónica.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Usted debe usarlo en la dosis y frecuencia recomendada por su médico, no obstante la dosis general recomendada es 2 gotas cada 2 a 4 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar en el canal auditivo, se recomienda taponar el oído con algodón luego de la aplicación.

No debe calentar la solución antes de aplicarla.

- Uso prolongado

Este medicamento no se debe usar por periodos prolongados de tiempo.

Si los síntomas persisten o empeoran después de un par de días consulte con el médico

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, no es probable que su aplicación durante el embarazo cause daño en el **feto**, no obstante es preferible que consulte a su médico. No debe utilizarse durante los últimos 3 meses de embarazo

- Lactancia

Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, es poco probable que pase a la leche materna, no obstante debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra amamantando

Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años, ya que la piel de los niños es más susceptible a absorber este medicamento y presentar mayor sensibilidad a los efectos adversos del medicamento.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe aplicar este medicamento en zonas extensas de piel, especialmente si la piel presenta lesiones.

No debe aplicar sobre los ojos, la boca o la nariz.

Debe consultar a su médico, antes de aplicarse este medicamento, si ha presentado síntomas de alergia a preservantes.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a sulfatiazol, lidocaína u otro anestésico de uso tópico.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Aunque, al aplicar este medicamento sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo, usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, temblores, zumbido de oídos, ritmo irregular del corazón, dificultad para respirar, ansiedad, excitación, nerviosismo.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona