

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lidocaína 4%

Crema anestésica tópica

Lea este folleto detenidamente, contiene información importante para usted. Este medicamento puede ser empleado sin prescripción médica, no obstante es necesario que utilice LIDOCAINA cuidadosamente para obtener los mejores resultados.

Conserve este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

Consulte con su médico o farmacéutico si necesita más información

Si su condición empeora o no mejora después de 7 días de tratamiento, deberá consultar un médico, nuevamente

¿Para que se usa la lidocaína?

La lidocaína alivia el dolor causado por cortes y quemaduras leves, rasmilladuras, quemaduras de sol y picaduras de insectos.

¿Como actúa LIDOCAINA?

Una vez que la lidocaína llega al terminal nervioso provoca un adormecimiento en la piel y tejidos cercanos. Después de la aplicación de **LIDOCAINA** usted puede sentir una sensación de frío seguido por un entumecimiento en el área cubierta por la crema. Las zonas de la piel no cubiertas de crema no presentaran efecto.

Aunque no es necesario cubrir el área tratada después de la aplicación de **LIDOCAINA**, se recomienda cubrir el área tratada en niños para prevenir ingestión accidental o remoción de la crema.

¿Que contiene LIDOCAINA 4 %?

(4 g de lidocaína en 100g de crema). Contiene además como excipientes:

detallar cualitativamente según la última fórmula autorizada

Si usted cree que usted o su hijo son alérgicos a cualquiera de los componentes de la crema , consulte a su médico antes de usar **LIDOCAINA**.

¿Como usar LIDOCAINA?

Aplice **LIDOCAINA** en las áreas afectadas no más de 3 o 4 veces por día. Antes de aplicar use un jabón suave y abundante agua para lavar la piel a tratar. No use limpiadores conteniendo alcohol o acetona pues quitaran los aceites naturales de la piel que son necesarios para ayudar a la penetración de la crema en la piel. A continuación se indica como aplicar **LIDOCAINA**, con o sin parche oclusivo.

¿Como usar LIDOCAINA en niños?

No aplique **LIDOCAINA** a niños menores de 2 años de edad, a menos que su médico se lo señale.

Se recomienda utilizar parche oclusivo en niños para prevenir la ingestión accidental así como para mantener la crema en el sitio deseado mientras la lidocaína es absorbida por la piel.

Instrucciones de aplicación

Instrucciones de aplicación con parche oclusivo:

1. Se recomienda utilizar parche oclusivo en niños pequeños o en otras situaciones para evitar que la crema sea removida antes de que la lidocaína sea absorbida.
2. Lavar la zona afectada con agua y jabón suave. No utilizar alcohol o acetona.
3. Primero aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel, masajeando suavemente el área afectada. Luego aplicar suficiente crema para cubrir completamente el área afectada (aproximadamente la mitad de un tubo de 4 gramos de crema).
4. Cubra la crema con un parche transparente. Revise los bordes del parche asegurándose que la crema no se salga.

Instrucciones de aplicación sin parche oclusivo:

1. No es necesario utilizar parches con **LIDOCAINA**, sin embargo se recomienda el uso de parches en niños pequeños o en otras situaciones para evitar que la crema sea removida antes de que ejerza su acción.
2. Lave la zona afectada con agua y jabón suave. No utilizar alcohol o acetona.
3. Primero aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel, masajeando suavemente el área afectada. Luego aplicar suficiente crema para cubrir completamente el área afectada. Si usted nota que la crema se seca muy rápido después de su aplicación, agregue una pequeña cantidad adicional.

¿Que precauciones debe tener al usar **LIDOCAINA**?

- Mientras dura la acción de **LIDOCAINA** la zona tratada estará insensible al dolor por lo que se debe tener cuidado de evitar que se produzcan nuevas lesiones.
- **LIDOCAINA** es sólo para uso externo.
- No aplique **LIDOCAINA** en la nariz o boca.
- En caso de ingestión comuníquese con su médico o con el centro asistencial más cercano.
- No aplique **LIDOCAINA** en los ojos o cerca de los ojos. Si **LIDOCAINA** entra en contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y cubra el ojo hasta que la sensibilidad se recupere. Posteriormente contrólese con un médico.

- No use **LIDOCAINA** dentro de los oídos.
- No use grandes cantidades de **LIDOCAINA** especialmente en zonas muy sensibles o pliegues de la piel.
- La aplicación de **LIDOCAINA** en zonas muy extensas o con excesiva frecuencia puede producir efectos adversos serios.

¿Hay efectos adversos asociados con el uso de LIDOCAINA?

Rara vez pueden aparecer efectos adversos con el uso de **LIDOCAINA**. El efecto adverso más común es irritación, enrojecimiento, abrasión o rash. Aunque estos efectos adversos usualmente no requieren atención médica, si continúan o si son muy molestos, comuníquese con su médico. Si usted nota cualquier efecto inusual tal como visión borrosa, vértigo, somnolencia, dificultad par respirar, temblores, dolor de cabeza o palpitaciones, contáctese con su médico de inmediato.

Almacenamiento

Mantenga **LIDOCAINA** fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien cerrado a la temperatura señalada en el envase. No use **LIDOCAINA** después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Presentación:

Indicar las presentaciones autorizadas

Fecha revisión : 20/05/06