

<b>Nombre:</b> Lindano <b>Condición de venta:</b> Con receta médica de uso tópico <b>Clasificación:</b> pediculicida <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura (o) de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

-Composición y presentación:

-Principio activo:

-Excipientes:

### 1. - ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de escabiosis (sarna) o pediculosis (piojos o liendres), sólo en aquellos pacientes que no toleran o bien en quienes ha fallado otro tratamiento.

Recuerde que:

La sarna es una enfermedad que debe ser diagnosticada por un médico.

### 2. - Administración (tópica)

#### Rango y frecuencia

Para el tratamiento de la Sarna: Se aplica sólo una vez en una delgada capa desde el cuello a los pies.

Para el tratamiento de pediculosis: se aplica una sola vez .

#### Consejo de cómo administrarlo

Antes de que lo aplique :Debe tener la seguridad de que entendió las indicaciones de uso.

#### SARNA:

Para el tratamiento de escabiosis (Sarna) debe hacer lo que su médico le indique, pero la recomendación habitual es aplicar una capa delgada de Lindano en todo el cuerpo desde el cuello hasta los pies, especialmente en los pliegues y dejar puesto durante 8 a 12 horas.

Si usted aplica el Lindano sobre otra persona, use guantes y lave bien sus manos luego de la aplicación. Antes de usarlo, asegúrese que la piel está limpia y no tiene ninguna otra loción, crema o aceite sobre ella antes de la aplicación. Los aceites hacen que el Lindano se absorba más rápido en su piel y puede aumentar el riesgo de convulsiones.

Espere al menos 1 hora después del baño o ducha antes de aplicar el Lindano, ya que la piel mojada o caliente puede hacer que el Lindano se absorba más rápido en su piel y aumentar el riesgo de convulsiones.

No use el producto en su boca. No cubra el Lindano que está sobre su piel con algo que obstruya, como vendas, pañales, ropa de nylon, ropa apretada o mantas.

Para retirar el producto después de 8 a 12 horas desde su aplicación, deberá lavar completamente su cuerpo, pero no emplee agua caliente.

**Luego de usarlo, bote el resto de Lindano al alcantarillado y enjuague el frasco tres veces antes de eliminarlo, lejos del alcance de los niños.**

Lindano no es más efectivo si lo usa por un periodo mayor a 8 - 12 horas. El uso por un tiempo mas prolongado puede ocasionar efectos adversos serios, como convulsiones . Después de que usted se quite todo el Lindano: debe hervir toda la ropa que traía puesta, la ropa interior, el pijama, las sábanas , fundas de almohada, y toallas.

No use el Lindano otra vez. Si usted cree que tiene que volver a usarlo, debe consultar primero con su médico . Usted puede tener picazón después de haber usado Lindano, pero esto no significa que necesite volver a usarlo. Incluso después de que todos los ácaros de la sarna están muertos, todavía puede haber picazón en la piel durante unas semanas. El Lindano también podría provocar un aumento de la picazón. Acuda a su médico para saber que puede hacer para calmarla.

### **PEDICULOSIS:**

Para el tratamiento de la pediculosis (piojos y liendres) primero debe lavar el cabello con el champú normal, sin usar acondicionador y luego de secarlo, esperar una hora antes de aplicar Lindano sobre el cuero cabelludo y dejarlo actuar durante 4 minutos, (durante este periodo no cubra su cabeza con toallas o gorro), después enjuagar el cabello con abundante agua y peinar con un peine fino todos los días (se recomienda impregnar el peine en vinagre).

Si los piojos están en el área pubica y se tiene una pareja sexual, esta también debe ser tratada. Aplicando el producto después del aseo diario.

Debe hervir toda la ropa que traía puesta, especialmente los gorros, el pijama, sábanas, fundas de almohada, y toallas.

### **Uso prolongado**

Lindano se debe aplicar sólo 1 vez para tratar la sarna o la pediculosis (piojos). No use el Lindano nuevamente para tratar un segundo ataque de sarna o pediculosis, ya que usándolo más de una vez podrían producirse convulsiones. Si todavía tiene picazón después de la utilización de Lindano, no lo use otra vez, ya que el ácaro de la sarna y

también los piojos, pueden producir picazón hasta unas semanas después de estar muertos.

### 3.-ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

**Advertencia:** Lindano sólo se debe usar en adultos y niños que pesen más de 50 kg. Si usted pesa menos de 50 kg, use Lindano sólo si su médico cree que es realmente necesario. Las personas que pesan menos de 50 kg, especialmente los niños y ancianos, tienen más posibilidades de presentar efectos secundarios debido a que es mayor la cantidad de Lindano que puede absorberse en su piel.

#### Precauciones:

##### Mayores de 60 años

La piel de los ancianos es más sensible a este tipo de medicamentos, por lo que debe consultar con su médico antes de utilizarlo.

##### Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

##### Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel y causar daño al **feto**, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

##### Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel y pasar a la leche materna, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

##### Lactantes y niños

No use este medicamento en niños que pesen menos de 50 Kg

##### Precauciones especiales

-No use más Lindano que lo que se indica en las instrucciones.

-Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

-Debe evitar aplicar este medicamento en la boca o tragarlo, ya que al ingerirlo es un veneno. Si usted traga Lindano, llame a un Centro toxicológico enseguida y consiga ayuda de emergencia.

-Si usted o un miembro de su familia presentan convulsiones al usar Lindano, debe buscar asistencia médica.

-No debe aplicar este medicamento en los ojos u otras membranas como dentro de la nariz, ya que Lindano puede causar irritación. Si esto sucede debe lavar con abundante agua.

-No use Lindano a menos que otro tratamiento anterior no haya sido efectivo, o que los otros medicamentos a usar estén contraindicados en su caso.

Lindano se debe aplicar sólo una vez para tratar la sarna o la pediculosis (piojos y liendres). No use el Lindano nuevamente para tratar un segundo ataque de sarna o pediculosis, ya que usándolo más de una vez podrían producirse convulsiones. Si todavía tiene picazón después de la utilización de Lindano, no lo use otra vez, ya que el ácaro de la sarna y también los piojos, pueden producir picazón hasta unas semanas después de estar muertos.

**4.- Contraindicaciones :** Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Si ha presentado alguna reacción adversa o síntoma de alergia a Lindano.
- No use Lindano si usted no tiene sarna ni piojos. Lindano no sirve para prevenir el contagio con sarna o piojos. Lindano sólo sirve como tratamiento.
- Si usted tiene o alguna vez ha tenido convulsiones o epilepsia y estas no están controladas.
- Si ha usado Lindano hace pocos meses.
- Si usted tiene la piel dañada o herida.
- Si tiene que tratar a un bebé prematuro o a un niño, ya que el Lindano se puede absorber a través la piel del bebé y llegar a su cerebro, lo que puede dañarlo.
- Si usted tiene Sarna y está amamantando, ya que Lindano puede pasar a la leche y además, Lindano al estar en su piel también puede llegar a su bebé y este puede enfermarse. En este caso pida a su médico un tratamiento más seguro. Si usted usa Lindano, suspenda la lactancia por al menos 24 horas después de la utilización del producto. Durante este tiempo, alimente a su bebe con una leche formulada para bebés o con leche materna que usted se haya sacado y almacenado antes de usar Lindano.

**5.- Interacciones**

Informe a su médico o farmacéutico sobre todas los medicamentos que usted toma, incluyendo los que son indicados y aquellos que toma sin indicación médica, vitaminas, y medicamentos a base de hierbas. Algunos medicamentos pueden aumentar la posibilidad de tener una convulsión si usted los toma mientras usa Lindano. Sobre todo si usted toma medicamentos sedantes (que ayudan a dormir), antipsicóticos, antidepresivos, medios de contraste radiológicos.

### Enfermedades

Usted debe consultar con un médico o un farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alteraciones de la piel, como heridas o si alguna vez ha tenido convulsiones o algún problema que pudiese aumentar la probabilidad de tener una convulsión (como un traumatismo craneano, un tumor cerebral o en la médula espinal, cirrosis hepática, o alcoholismo.), si tiene el VIH o el SIDA. Lindano puede causar convulsiones incluso si usted nunca las ha tenido antes.

### 6.- Efectos adversos

#### Serios

Si usted presenta alguno de los siguientes efectos: irritación de la piel, rash, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar, temblores que no se pueden controlar o convulsiones, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

#### Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, irritación local, sensación de quemaduras, picazón, piel seca y erupción.

### 7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel, en las mucosas o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: convulsiones, mareos, confusión, calambres, nerviosismo, irritabilidad, vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado o usado.

#### RECUERDE:

**No use Lindano para ninguna condición para la cual no fue indicado. No administre Lindano a otras personas, incluso si ellos tienen los mismos síntomas que usted. Mantenga el Lindano y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Este**

**folleto resume la información más importante sobre el uso de Lindano. Si usted quiere más información, converse con su médico o farmacéutico.**

**Teléfono de atención toxicológica:**

**Versión revisada el 22 de diciembre de 2006**