

Nombre: Lorazepam Condición de venta: con receta médica retenida Clasificación: ansiolítico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado como tratamiento para el manejo de las alteraciones ansiosas o para alivio de corto plazo de los síntomas de ansiedad o la ansiedad asociada con síntomas depresivos, a estados psicóticos y en la depresión severa que requiera una terapia adicional.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 2 a 6 mg. Diarios en dosis divididas.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento junto a las comidas para evitar problemas estomacales.

- Uso prolongado

En el tratamiento de insomnio se recomienda evitar periodos de tratamiento superiores a 2 o 3 semanas, por lo que usted debe tomarlo solamente por el periodo de tiempo señalado por su médico. El uso prolongado de este medicamento causa **dependencia**, la suspensión del medicamento no debe ser brusca, ya que puede producir un **síndrome de abstinencia** caracterizado por **ansiedad**, agitación, temblores, **insomnio**.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe tener especial precaución si se encuentra en tratamiento con lorazepam.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos, principalmente a nivel del **sistema nervioso central** (dificultad para concentrarse, depresión y otros).

- Manejo de vehículos

Este medicamento disminuye su estado de alerta y su capacidad de reaccionar frente a imprevisto, por lo tanto evite manejar vehículos, maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad de riesgo mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o si debe dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se recomienda utilizar este medicamento en niños menores de 12 años, ya que los niños son más sensibles a los efectos adversos del medicamento. El uso de lorazepam en niños es posible solo en las condiciones determinadas por su pediatra.

- Precauciones especiales

No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico le debe indicar la forma en que debe ir reduciendo la dosis a tomar.

Se puede producir olvido de acontecimientos recientes por efecto de este medicamento.

Nunca se deben tomar dosis mayores que las recomendadas por su médico.

Mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento no debe consumir alcohol y debe evitar el consumo de cafeína.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a lorazepam o cualquier otra benzodiazepina .

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

No debe usar este medicamento si padece de **miastenia gravis**, o a sufrido recientemente de **intoxicación etílica** aguda, coma o **shock**.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: anticonceptivos orales, alcohol etílico, aminofilina, clozapina, levodopa, loxapina, ácido valproico, zidovudina, depresores del sistema nervioso central como clorfenamina, fenobarbital, pseudoefedrina, medicamentos para el resfrío, etc.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, **glaucoma**, antecedentes de drogodependencia, **miastenia gravis**, **hiperactividad**, depresión, **apnea de sueño**, **porfiria**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para concentrarse, depresión, **alucinaciones**, disminución de la **presión arterial**, confusión, debilidad muscular, **rash** o picazón de la piel, sequedad de garganta, fiebre y escalofríos, úlceras en la garganta o la boca, moretones o **hemorragias** inusuales, **fatiga** extrema, ojos o piel de color amarillo.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sedación, vértigo, debilidad, inestabilidad.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **somnolencia** extrema, confusión, dificultad para respirar, reflejos más lentos, pobre coordinación, temblor, pérdida de la conciencia, coma. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.