

Nombre: Magaldrato - Simeticona Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiácido - antiflatulento Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el alivio temporal de la acidez y mal estar estomacal.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Adultos: 60 a 125 mg de simeticona + 0,5 a 1 g se magaldrato 4 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento luego de las comidas y antes de ir a dormir.

- Uso prolongado

Si luego de un par de días sus síntomas persisten o aumentan debe consultar con su médico, ya que el medicamento puede estar ocultando una enfermedad grave.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, se pueden presentar constipación o problemas intestinales, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con magaldrato – simeticona.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha observado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño.

Lactantes y niños

No se debe usar antiácidos en niños menores de 6 años, a menos que su pediatra lo indique. No se recomienda su uso para el tratamiento de cólicos .

- Precauciones especiales

Se recomienda moverse o salir a caminar para estimular la eliminación de gases.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a magaldrato y / o simeticona.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. Este medicamento altera la absorción de otros medicamentos. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: vitamina D, digoxina, isoniazida, ketoconazol, penicilamina, nitrofurantoina, quinidina, tetraciclina, ciprofloxacino.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **enfermedad de Alzheimer**, **apendicitis**, fracturas de huesos, **colitis**, constipación, **hemorroides**, bloqueo intestinal, hemorragia intestinal o rectal, **colostomía**, **ileostomía**, diarrea, edema, **toxemia de embarazo**, **sarcoidosis**, **hipoparatioidismo**.

- Alimentos

Debe evitar ingerir alimentos que aumenten la formación de gas, como repollo, granos, legumbres, bebidas gaseosas, etc.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: síntomas de hipersensibilidad como dificultad para respirar, **rash**, **urticaria**, inflamación de ojos, boca, lengua, dolor de huesos, sensación de mal estar, constipación, pérdida del apetito, debilidad muscular, cambios de carácter, pérdida de peso inusual, dificultad para orinar, ritmo irregular del corazón.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: eliminación excesiva de gases y flatulencia, sabor a tiza en la boca, constipación, dolor estomacal, heces de color blanquecino.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: síntomas de hipersensibilidad como dificultad para respirar, **rash**, **urticaria**, inflamación de ojos, boca, lengua, diarrea, náuseas, vómitos, constipación, confusión palpitaciones, debilidad, fatiga, dolor de huesos, estupor.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.