

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre: Mepiramina – Pamabron - Paracetamol ** Condición de venta: sin receta médica Clasificación: Analgésico Disponible en: | Nombres de marca: |
|---|--------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos es utilizada en el tratamiento sintomático del síndrome premenstrual.

2.- Administración (oral, rectal)

- Rango y frecuencia

La dosis generalmente utilizada es de: Mepiramina 15 mg + Pamabron 25 mg + paracetamol 500 mg cada 4 a 6 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Se debe tomar con agua 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas.

- Uso prolongado

Este puede causar problemas al hígado, a los riñones, o **anemia** en algunos pacientes.

Este medicamento no se debe usar por un tiempo prolongado, a menos que su médico lo indique.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con este medicamento.

- Consumo de alcohol

Se debe evitar consumir alcohol, la combinación de este con paracetamol puede provocar serios problemas al hígado.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia. Este medicamento puede disminuir el flujo de leche.

- Lactantes y niños

Este medicamento no se encuentra indicado para ser utilizado en niños.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Algunos preparados pueden llevar como endulzante aspartamo, en tal caso debe tener precaución si padece de **fenilcetonuria**.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha ingerido alcohol, si tiene algún tipo de insuficiencia hepática o renal (en algunos casos el médico puede hacer un ajuste de dosis). Si usted ha presentado síntomas de alergia a mepiramina, pamabron y /o paracetamol. Si a presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente anticoagulantes (como warfarina), ácido acetilsalicílico (aspirina), cualquier antiinflamatorio no esterooidal, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sulfapirazonas, isoniazida, nicotina, zidovudina, maprotilina, trazodona, amantadina, metoclopramida, atropina, haloperidol, ipratropio, fenotiazinas, procainamida, apomorfina, cisplatino, paromomicina, salicilatos, vancomicina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, **fenilcetonuria**, o un historial de abuso de alcohol, **glaucoma**, **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **asma**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacción alérgica al paracetamol, que se presenta con rash, picazón, hinchazón, o dificultad para respirar; piel y ojos de color amarillo (indican daño hepático), dolor de garganta y fiebre (que no se han presentado antes del tratamiento, y que no responden a causas de la condición que se está tratando), inexplicables **hemorragias** o moretones, sangre en la orina, dolor, menor o mayor frecuencia al orinar, cansancio o debilidad no habitual, opresión en el pecho, somnolencia, espesamiento de las secreciones bronquiales.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: fatiga o debilidad, somnolencia, sequedad de boca.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, calambres o dolor estomacal, desmayos, torpeza o inestabilidad, sequedad de boca, nariz o garganta severas, sofoco o enrojecimiento de la cara, sensación de falta de aire, somnolencia severa, **alucinaciones**, crisis convulsivas, problemas para dormir, dolor de cabeza. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.