

Nombre: Metronidazol vaginal Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiótico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de vaginitis producidas por tricomonas y vaginitis no especificadas.

2.- Administración (vaginal)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Tricomoniasis: 1 óvulo (500 Mg.) vía vaginal en la noche por un período de 10 días, en combinación con tratamiento por vía oral.
- Vaginitis no especificada: 1 óvulo (500 Mg.) vía vaginal en la noche por un periodo de 7 días, en combinación con tratamiento por vía oral si es necesario.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Lave sus manos antes y después de utilizar esta medicina.

Se recomienda aplicar el medicamento y luego mantenerse un par de minutos recostada para evitar que el medicamento se derrame. Es aconsejable que utilice ropa interior de algodón y cambiarla a diario.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Debe administrarse con precaución en pacientes ancianos, siguiendo las indicaciones de su médico.

- Embarazo

No debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo, en el segundo y tercer trimestre puede utilizarse sólo si no existe una alternativa más segura.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

No existe información sobre la seguridad de utilizar este medicamento en niños, debe seguir las indicaciones de su médico.

- **Precauciones especiales**

Si usa el medicamento para tratar tricomoniasis, se recomienda que el tratamiento se lleve a cabo por ambos miembros de la pareja, incluso si uno de los dos no presenta síntomas de la enfermedad.

Debe evitar mantener relaciones sexuales durante el tratamiento con este medicamento.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Evite el consumo de alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento y por lo menos 1 día después de terminado el tratamiento, ya que se pueden producir mareos, sofocos u otras reacciones serias.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al metronidazol o a los nitroimidazoles.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alcohol, warfarina, acenocumarol, disulfiram

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades sanguíneas, **epilepsia** u otras enfermedades del sistema nervioso central.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: picazón vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, flujo vaginal blanco y espeso, dolor o calambres estomacales, irritación de los órganos sexuales, ardor al orinar, mayor frecuencia para orinar, picazón del área genital.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, pérdida del apetito, sequedad de boca, alteraciones del gusto, dolor abdominal.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre áreas extensas de la piel, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.