

<b>Nombre:</b> Miconazol tópico <b>Condición de venta:</b> con receta médica de uso tópico <b>Clasificación:</b> antifúngico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el tratamiento de micosis cutáneas (superficiales) causadas por microorganismos sensibles.

**Este medicamento exige diagnóstico supervisión médica.**

### 2.- Administración (tópica)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar una cantidad suficiente en el área afectada dos veces al día.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Antes de aplicarse la medicina lave la piel con agua y jabón y séquela luego con una toalla.

Aplique una capa delgada en el área afectada. Frote el medicamento suavemente. Use en los dos pies si usted tiene pies de atleta.

No debe utilizar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.

Debe lavar sus manos antes y después de cada aplicación.

#### - Uso prolongado

Use este medicamento por el tiempo señalado por su médico, aunque sus síntomas hayan desaparecido

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**.

- **Lactancia**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra.

No se recomienda su uso en niños menores de 2 años.

**Precauciones especiales**

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes.

Debe evitar el contacto del medicamento con los ojos.

**4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a miconazol u otro **antifúngico azólico**.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: quemazón, palidez de la piel, **rash**, irritación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

**7.- Sobredosis**

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.